

Antitumoral regim - Huvud- och halscancer

Behandlingsavsikt: Palliativ  
RegimID: NRB-9215

Pembrolizumab-Karboplatin AUC5 -Paklitaxel 175

Kurintervall: 21 dagar

Översikt

Läkemedel

| Substans         | Admini-<br>strering    | Spädning                                     | Infusions-<br>tid | Grunddos/<br>admtillfälle | Beräk-<br>ningsätt               | Maxdos/<br>admtillfälle | Max ack.<br>dos |
|------------------|------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1. Pembrolizumab | Intravenös<br>infusion | 100 ml<br>Natriumklorid 9<br>mg/ml infusion  | 30 min.           | 2 mg/kg                   | kroppsvikt                       | 200 mg                  |                 |
| 2. Paklitaxel    | Intravenös<br>infusion | 1000 ml<br>Natriumklorid 9<br>mg/ml infusion | 3 tim.            | 175 mg/m <sup>2</sup>     | kroppsyta                        |                         |                 |
| 3. Karboplatin   | Intravenös<br>infusion | 250 ml Glukos 50<br>mg/ml infusion           | 30 min.           | 5 × (GFR+25)<br>mg        | njurfunktion<br>(AUC<br>Calvert) |                         |                 |

Regimbeskrivning

| Dag                                                           | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Ny kur dag<br>22 |
|---------------------------------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------------|
| 1. Pembrolizumab<br>Intravenös infusion<br>2 mg/kg            | x1 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                  |
| 2. Paklitaxel<br>Intravenös infusion<br>175 mg/m <sup>2</sup> | x1 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                  |
| 3. Karboplatin<br>Intravenös infusion<br>5 × (GFR+25) mg      | x1 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                  |

**Emetogenicitet:** Hög

**Behandlingsöversikt**

**Alternativ dosering för Pembrolizumab är 200 mg standarddos var 3:e vecka.**

Provtagning för immunrelaterade biverkningar minst månadsvis.

Anvisningar för regimen

**Villkor för start av regimen**

PDL1≥1 enl. metoden CPS (Combined positive Score)

Blodstatus: Hb, LPK, neutrofila, TPK

Elektrolytstatus: Na, K, Ca, kreatinin. Njurclearance (Cystatin C, Iohexol-, kreatininclearance eller motsvarande).

Leverstatus: albumin, ALP, ALAT, bilirubin, LD

Amylas, CRP, glukos

Thyroidea: TSH, T4 fritt

**Villkor och kontroller för administration**

Ökad beredskap för anafylaktisk reaktion.

*Paklitaxel*

Överkänslighetsreaktioner är vanliga, särskilt kur 1 och 2. Puls och blodtryck före start.

Använd pvc-fritt inf aggregat med inbyggt eller monterat filter (högst 0,22 mikrometer porstorlek) vid infusion.

*Karboplatin*: Dosering av totaldos enligt Calverts formel:  $AUC \times (GFR+25)$ . Använd absolut värde = okorrigerat GFR (ml/min). För estimering av eGFR och konvertering från relativt värde = korrigerad GFR (ml/min/1,73m<sup>2</sup>) till okorrigerat GFR, använd kalkylator på <https://egfr.se/> För utförliga anvisningar se "basfakta om läkemedel" för Karboplatin.

*Pembrolizumab*

Sköterskekontakt en vecka efter behandling; därefter kontakt enligt individuell bedömning. Kontroll av immunrelaterade biverkningar, som främst berör GI, lever, hud, neurologi och endokrina system.

Använd inbyggt eller monterat filter med (porstorlek 0,2 -0,5 mikrometer).

**Anvisningar för ordination**

Blodstatus: Hb, LPK, neutrofila, TPK, elektrolytstatus inkl kreatinin.

För behandlingsstart neutrofila > 1,5, TPK > 100.

*Karboplatin* - Dosering av totaldos enligt Calverts formel:  $AUC \times (GFR+25)$ . Använd absolut värde = okorrigerat GFR (ml/min). För estimering av eGFR och konvertering från relativt värde = korrigerad GFR (ml/min/1.73m<sup>2</sup>) till okorrigerat GFR, använd kalkylator på <http://egfr.se/> För utförliga anvisningar se "basfakta om läkemedel" för Karboplatin.

*Paklitaxel* - Premedicinering med kortison och antihistaminer, t.ex. peroral behandling med Betametason 8 mg och Desloratadin 10 mg som ges 1-2 timmar före behandlingsstart.

Om tidigare reaktion överväg premedicinering med kortison och antihistamin med start dagen före behandling alternativt avsluta behandlingen.

Kontroll av perifer neuropati.

*Pembrolizumab*

Elektrolytstatus: Na, K, Ca, kreatinin

Leverstatus: albumin, ALP, ALAT, bilirubin, LD

Amylas, CRP, glukos

Thyroidea: TSH, T4 fritt

Dessa kontroller ska också följas en gång/månad i 6 månader efter avslutad behandling.

Kontroll av immunrelaterade biverkningar, som kan uppkomma sent. Immunhämmande behandling med i första hand kortikosteroider kan behövas, se FASS.

Vid eventuell infusionsreaktion kan premedicinering med Paracetamol och Desloratadin ges

**Dosjustering rekommendation***Pembrolizumab*

Dosreduceras ej. Uppehåll eller behandlingsavslut vid toxicitet.

*Paklitaxel/Karboplatin*

Neutrofila < 1,5 eller TPK < 100 - behandlingen skjuts upp.

Neuropati ≥ grad 2 överväg dossänkning av Paklitaxel.

**Övrig information***Pembrolizumab*

Patienten ska få tydlig information om eventuella biverkningar.

**Biverkningar**

| <b>Pembrolizumab</b><br><b>Observandum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Kontroll</b>          | <b>Stödjande behandling</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Övrigt</b><br>Observera att biverkningar generellt kan uppstå sent, även efter behandlingsavslut.<br>Eventuellt behov av kortikosteroidbehandling, se FASS.                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                             |
| <b>Akut infusionsreaktion/anafylaxi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Blodtryck<br>Puls        | Akutberedskap               |
| Infusionsrelaterad reaktion förekommer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                             |
| <b>Hematologisk toxicitet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Blodvärden               | Enligt lokala riktlinjer    |
| Anemi, neutropeni och trombocytopeni förekommer, oftast grad 1-2, kan dock nå grad 3 - 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                             |
| <b>Andningsvägar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | Kortikosteroid              |
| Andnöd och hosta vanligt. Övre luftvägsinfektion och lunginflammation förekommer. Pneumonit förekommer, kan uppstå sent efter behandlingsstart, utred vid misstanke, eventuellt behandlingsuppehåll eller utsättning och kortisonbehandlingsbehov, se FASS.                                                                                                                                                           |                          |                             |
| <b>Gastrointestinal påverkan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | Kortikosteroid              |
| Illamående, kräkning, diarré, förstoppning, buksmärtor och nedsatt aptit vanligt. Kolit och pankreatit förekommer, kan uppstå sent efter behandlingsstart, eventuellt behandlingsuppehåll eller utsättning och kortisonbehandlingsbehov, se FASS.                                                                                                                                                                     |                          |                             |
| <b>Levertoxicitet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Leverfunktion            | Kortikosteroid              |
| Förhöjda levervärden vanligt. Hepatit förekommer, kan uppstå sent efter behandlingsstart, eventuellt behandlingssuppehåll eller utsättning och kortisonbehandlingsbehov, se FASS.                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                             |
| <b>Njurtoxicitet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Njurfunktion             | Kortikosteroid              |
| Nefrit har rapporterats i enstaka fall, följ njurfunktion. Eventuellt kortikosteroidbehandling, se FASS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                             |
| <b>Endokrinologi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Elektrolyter<br>Tyroidea | Kortikosteroid              |
| Immunrelaterade endokrinopatier. Hyponatremi, hypo- och hyperkalemi, hypo- och hyperkalcemi och hypomagnesemi. Sköldkörtelfunktionsrubbningar förekommer. Hyperglykemi. Enstaka fall av binjurebarksvikt, diabetes och hypofysit.                                                                                                                                                                                     |                          |                             |
| <b>Hudtoxicitet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Biverkningskontroll      |                             |
| Utslag och klåda vanligt. Vitiligo förekommer.<br><br>Svåra hudbiverkningar har rapporterats i sällsynta fall, inklusive Stevens Johnsons syndrom (SJS) och toxisk epidermal nekrolys (TEN). Monitorera hudbiverkan, gör uppehåll i behandling och utred vid misstanke om svår hudbiverkan, utsätt vid diagnos, se FASS. Extra försiktighet vid tidigare allvarlig hudreaktion på annan immunstimulerande behandling. |                          |                             |
| <b>CNS påverkan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Biverkningskontroll      |                             |
| Huvudvärk. Perifer neuropati. Yrsel.<br><br>Rapporter finns om icke-infektiös meningit, Guillain-Barrés syndrom och myasteniskt syndrom.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                             |
| <b>Smärta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                             |
| Ledsmärta och muskelsmärta vanligt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                             |
| <b>Perifera ödem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                             |
| Perifera ödem vanligt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                             |
| <b>Övrigt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                             |
| Trötthet / fatigue vanligt. Feber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                             |
| <b>Hjärttoxicitet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EKG                      |                             |
| Myokardit fallrapporter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                             |
| <b>Extravasering</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                             |
| <b>Grön</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                             |
| Klassas som ej vävnadsskadande (låg eller minimal risk för vävnadsskada vid extravasering).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                             |

| <b>Paklitaxel</b><br><b>Observandum</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>Kontroll</b>   | <b>Stödjande behandling</b>                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Akut infusionsreaktion/anafylaxi</b>                                                                                                                                                                                                 | Blodtryck<br>Puls | Akutberedskap<br>Kortikosteroid<br>Antihistamin<br>H2 antagonist |
| Premedicinering. Enligt FASS: Kortikosteroid, Antihistamin och H2-antagonist (Histamin-2-receptorantagonist). H2-antagonist har dock tagits bort i regiminstruktionerna, i studier har avsaknad av H2-antagonist ej visat sämre effekt. |                   |                                                                  |
| <b>Hematologisk toxicitet</b>                                                                                                                                                                                                           | Blodvärden        | Enligt lokala riktlinjer                                         |
| Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.                                                                                                                                                                          |                   |                                                                  |
| <b>Hudtoxicitet</b>                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                  |
| Alopeci mycket vanligt. Nagel och hudförändringar förekommer.                                                                                                                                                                           |                   |                                                                  |

Fortsättning på nästa sida

**Paklitaxel (Fortsättning)**

| Observandum                                                                                                        | Kontroll | Stödjande behandling |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| <b>Gastrointestinal påverkan</b>                                                                                   |          |                      |
| Illamående, kräkningar och diarré mycket vanligt. Stomatit vanligt.                                                |          |                      |
| <b>Neuropati</b>                                                                                                   |          |                      |
| Biverkningskontroll                                                                                                |          |                      |
| Neuropati är vanligt, oftast mild, dock kan eventuellt dosjusteringsbehov föreligga, se FASS.                      |          |                      |
| <b>Hjärttoxicitet</b>                                                                                              |          |                      |
| EKG                                                                                                                |          |                      |
| Bradykardi förekommer. Myokardinfarkt och takykardi finns rapporterat. Hjärtsvikt sällsynt.                        |          |                      |
| <b>Levertoxicitet</b>                                                                                              |          |                      |
| Leverfunktion                                                                                                      |          |                      |
| Måttlig till svår leverfunktionsnedsättning kan medföra ökad risk för biverkningar, framför allt myelosuppression. |          |                      |
| <b>Övrigt</b>                                                                                                      |          |                      |
| Ledvärk och muskelsmärta mycket vanligt.                                                                           |          |                      |
| <b>Extravasering</b>                                                                                               |          |                      |
| Kyla                                                                                                               |          |                      |
| <b>Gul</b>                                                                                                         |          |                      |
| Hyaluronidas                                                                                                       |          |                      |
| Klassas som vävnadsretande, men ger sällan allvarlig skada (medelhög risk för vävnadsskada).                       |          |                      |
| Följ instruktion för kylbehandling, se extravaseringsdokument.                                                     |          |                      |
| Överväg lokal behandling med Hyaluronidas.                                                                         |          |                      |

Traditionellt har kyla varit den specifika åtgärden vid extravasering av taxaner. Det finns nu uppgifter om att värme skulle kunna vara lika bra, med en teoribildning kring att taxaner är icke-DNA bindande (non-DNA binding agents) och därmed liknar vinkaalkaloider. Uppgifterna är dock vaga. Tills bättre fakta kring detta finns föreslås instruktionen för specifik behandling med kyla.

**Interaktionsbenägen substans**

Paklitaxel metaboliseras delvis via CYP2C8 och CYP3A4.

Avsaknad av läkemedelsinteraktionsstudie.

Samtidig administrering av hämmare av antingen CYP2C8 eller CYP3A4 med Paklitaxel skall medföra försiktighet då risk eventuellt finns för ökad toxicitet genom högre paklitaxel-exponering. (Exempel på hämmare av antingen CYP2C8 eller CYP3A4 är ketokonazol och andra imidazol-antimykotika, erytromycin, fluoxetin, gemfibrozil, klopido-rel, cimetidin, ritonavir, sakvinavir, indinavir och nelfinavir.)

Samtidig administrering av inducerare av antingen CYP2C8 eller CYP3A4 med Paklitaxel rekommenderas inte då risk finns för minskad effekt av Paklitaxel till följd av minskad Paklitaxel exponering. (Exempel på inducerare av antingen CYP2C8 eller CYP3A4 är rifampicin, karbamazepin, fenytoin, efavirenz, nevirapin.)

Vid administrering i kombination med cisplatin skall Paklitaxel ges före Cisplatin för att undvika risk för ökad myelosuppression som ses om Paklitaxel ges efter Cisplatin, se FASS.

**Karboplatin**

| Observandum                                                                                                      | Kontroll | Stödjande behandling |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| <b>Akut infusionsreaktion/anafylaxi</b>                                                                          |          |                      |
| Blodtryck                                                                                                        |          |                      |
| Puls                                                                                                             |          |                      |
| Akutberedskap                                                                                                    |          |                      |
| Antihistamin                                                                                                     |          |                      |
| Kortikosteroid                                                                                                   |          |                      |
| Överkänslighetsreaktioner finns. Riskökning vid många kurer.                                                     |          |                      |
| Inom gynekologisk cancer riskökning efter >6 kurer eller vid reintroduktion efter paus. Överväg Extended karbo-  |          |                      |
| platin regim med förlängd infusionstid till 3 timmar samt upptrappande infusionshastighet och spädningsvätska    |          |                      |
| 1000 ml. Se referens.                                                                                            |          |                      |
| Överväg profylax med antihistamin och/eller kortikosteroider.                                                    |          |                      |
| <b>Hematologisk toxicitet</b>                                                                                    |          |                      |
| Blodvärden                                                                                                       |          |                      |
| Enligt lokala riktlinjer                                                                                         |          |                      |
| Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.                                                   |          |                      |
| <b>Njurtoxicitet</b>                                                                                             |          |                      |
| Njurfunktion                                                                                                     |          |                      |
| Njurfunktionsstörning förekommer men är vanligtvis inte dosbegränsande toxicitet, och uppvätskning behövs oftast |          |                      |
| inte. Försiktighet med nefrotiska läkemedel inkl aminoglykosider.                                                |          |                      |
| <b>Neuropati</b>                                                                                                 |          |                      |
| Biverkningskontroll                                                                                              |          |                      |
| Perifer neuropati förekommer, oftast mild vid konventionella doser. Symtom mestadels beskrivet som parestesi och |          |                      |
| minskade djupa senreflexer. Ökad risk hos patienter >65 år och hos dem som tidigare behandlats med Cisplatin.    |          |                      |
| <b>Hög emetogenicitet</b>                                                                                        |          |                      |
| Vid AUC 4 eller mer.                                                                                             |          |                      |
| <b>Extravasering</b>                                                                                             |          |                      |
| <b>Gul</b>                                                                                                       |          |                      |
| Klassas som vävnadsretande, men ger sällan allvarlig skada (medelhög risk för vävnadsskada).                     |          |                      |

Fortsättning på nästa sida

**Karboplatin (Fortsättning)**

| Observandum                                                                                                                                                                                                           | Kontroll | Stödjande behandling |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| <b>Interaktionsbenägen substans</b>                                                                                                                                                                                   |          |                      |
| Karboplatin kan interagera med aluminium och bilda en svart fällning.                                                                                                                                                 |          |                      |
| Samtidig administrering av vaccin mot Gula febern vid Karboplatinbehandling är kontraindicerad, risk för generaliserad vaccinsjukdom.                                                                                 |          |                      |
| Samtidig administrering av levande försvagade vacciner vid Karboplatinbehandling rekommenderas ej.                                                                                                                    |          |                      |
| Samtidig administrering av Fenytoin eller Fosfenytoin vid Karboplatinbehandling rekommenderas ej, risk för förvärrade kramper eller ökad risk för toxicitet.                                                          |          |                      |
| Samtidig administrering av diuretika inklusive loopdiuretika och andra nefrotoxiska eller ototoxiska substanser vid Karboplatinbehandling ska ske med försiktighet, risk för ökad eller förvärrad toxicitet, se FASS. |          |                      |

**Biverkningar för regimen**

| Observandum      | Kontroll | Stödjande behandling |
|------------------|----------|----------------------|
| <b>Häravfall</b> |          |                      |

**Referenser****Kalkylator för beräkning av eGFR**

<https://egfr.se/>

<https://egfr.se/>

**Versionsförändringar****Version 1.4**

Ändring till dosering baserad på kroppsvikt i enlighet med nya rutiner. Maxdos tillagd. Provtagning: ASAT bytt mot ALAT.

**Version 1.3**

Uppdaterat under anvisning för ordination om Karboplatin samt uppdaterat referens och länk.

**Version 1.2**

Patientinformation tillagd.

**Version 1.1**

Ändrat situations tecken under Anvisningar för ordination

**Version 1.0**

Regimen fastställdes