

Venetoklax 400-Obinutuzumab start

vid Hematologisk malignitet

Schema för regimen

| Dag          | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Obinutuzumab | X |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Obinutuzumab |   | X |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Obinutuzumab |   |   |   |   |   |   |   | X |   |    |    |    |    |    | X  |    |    |    |    |    |    |
| Venetoklax   | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |

| Dag          | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|--------------|----|----|----|----|----|----|----|
| Obinutuzumab |    |    |    |    |    |    |    |
| Obinutuzumab |    |    |    |    |    |    |    |
| Obinutuzumab |    |    |    |    |    |    |    |
| Venetoklax   | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |

Om din behandling

Obinutuzumab är en antikropp, som hämmar cancercellernas tillväxt. Venetoklax blockerar proteiner som reglerar cancercellernas tillväxt, så att den bromsas.

Första kuren är 28 dagar. Dag 1, 2, 8 och 15 får du dropp. Därefter får dropp var 28:e dag. Du tar tabletter venetoklax (Venclyxto) dagligen.

För att minska risken för allvarlig reaktion under tiden du får dropp med Obinutuzumab så får du läkemedel innan behandlingen startar. Det är störst risk för reaktion under de första behandlingarna.

Påverkan på blodvärden med anemi (lågt Hb), trombocytopeni (lågt antal blodplättar) och/eller neutropeni (lågt antal neutrofila granulocyter, en typ av vita blodkroppar) är vanligt. Dessa värden kontrolleras därför regelbundet med blodprover under behandlingen. Allt för låga värden kan leda till att behandlingen måste pausas eller dosen sänkas.

Så tar du läkemedlet

Svälj tabletterna hela med vatten i samband med måltid. Om du missar en dos, ta den bara om det är mer än 8 timmar kvar till nästa planerade dos.

Du får inte äta grapefrukt, pomerans eller stjärnfrukt (carambola) under behandlingen.

Läs mer i bipacksedeln.

Biverkningar - symtom och tips

Biverkningarna vi listar här är de vanligaste och viktigaste. De kan variera mycket mellan olika personer, och även från gång till gång. Biverkningarna kan avgöra din dos eller göra att det behövs ett uppehåll i behandlingen.

Berätta för din läkare eller sjuksköterska om du har biverkningar. Ofta kan besvären förebyggas eller lindras.

## Besvär med mage och tarm

Diarré är vanligt. Du kan även bli förstoppad.

**Tips:** Drick mycket, några glas mer än vanligt per dag. Om du har diarré, undvik fet, starkt kryddad och fiberrik mat. Om du är förstoppad, prova fiberrik mat och motion. Prata med din sjuksköterska om du får diarré eller förstoppning - du kan behöva läkemedel.

## Infektionskänslighet

Du kan lättare få infektioner under behandlingen. Det beror på att även friska B-cellers (och andra immuncellers) tillväxt och funktion i viss mån påverkas av behandlingen. Blodprover tas under behandlingen och om nivån av vita blodkroppar (immunceller) blir allt för låg kan man behöva göra uppehåll i behandlingen eller sänka dosen. Vid låga antikropps nivåer (immunglobuliner) i blodet kan man ibland behöva behandling med immunglobuliner.

Tips: Försök att undvika nära kontakt med personer som till exempel är förkylda eller magsjuka. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Handsprit kan vara ett komplement.

## Tumörlyssyndrom

En ovanlig men allvarlig biverkan där cancercellerna bryts ner allt för fort vilket frisätter ämnen som kan vara skadliga för bland annat njurarna. Detta kan ske i början av behandlingen och därför ökas Venetoclax-dosen gradvis och blodprover kontrolleras ofta. Dessutom får du läkemedel för att skydda njurarna i början av behandlingen. Det är också viktigt att vara extra noga med vätskeintaget under behandlingens första veckor när dosen ökas.

## Kontakta genast din klinik vid:

### Akut

Ring 112 vid ihållande akut bröstsmärta, tryck över bröstet eller svårt att andas/andnöd

### Kontakta genast din mottagning vid:

- Feber över 38 grader, eller temperatur lägre än 36 grader.
- Kraftig diarré, eller diarré i kombination med feber.
- Blåmärken, näsblod eller annan blödning som du inte får stopp på.
- Hjärtklappning
- Hudutslag på större delen av kroppen, eller hudutslag med smärta.
- Plötslig försämring, oavsett symtom.

## Allmänna råd

Det är viktigt att inte bli gravid eller göra någon gravid när du behandlas med cancerläkemedel, eftersom läkemedlen kan påverka fostret. Använd därför säkra preventivmedel. Ibland behövs dubbelt skydd, biverkningar som diarré eller direkt påverkan av cancerläkemedel kan göra att P-piller inte räcker som ensamt skydd.

## Allmän information om cancer

Bra information om cancer finns hos både 1177 och Cancerfonden:

[www.1177.se](http://www.1177.se)

[www.cancerfonden.se](http://www.cancerfonden.se)

## Anteckningar

---

---