

## Bevacizumab 15 mg/kg

في حالة سرطان عنق الرحم والمهبل

الجدول الزمني للعلاج (يُقرأ الجدول من اليسار إلى اليمين)

22 قديجة عرج موي

يوم	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Bevacizumab	X																				

## فيما يتعلق بعلاجك

بيفاسيزوماب (Avastin) يعطى عن عبارة عن أجسام مضادة مثبتة لنمو الخلايا السرطانية. مدة كل دورة من هذا العلاج (21 يوماً)، تعطى على شكل حقنة وريدية في اليوم الأول، بعد ذلك استراحة لمدة (20) يوماً قبل البدء بالدورة الجديدة. وسيتم أثناء العلاج مراقبة فحوصات دمك وأي آثار جانبية محتملة.

## آثار جانبية - الأعراض ونصائح

الآثار الجانبية التي ندرجها هنا هي الأكثر شيوعاً وأهمية. ويمكن أن تختلف اختلافاً كبيراً من شخص لآخر، وحتى من وقت لآخر. وقد تحدث الآثار الجانبية جرعتك أو تستدعي التوقف عن تناول الدواء. استشر طبيبك أو ممرضتك إذا عانيت من أي آثار جانبية، ففي كثير من الأحيان يمكن تجنب هذه الأعراض أو التخفيف من حدتها.

## النزيف

قد تواجه خطورة متزايدة للإصابة بالنزيف. فربما تُصاب بنزيف الأنف أو الضم أو الشرج على سبيل المثال. وإذا تعرضت لجرح جلدي، فمن الممكن أن تنزف لفترة أطول من المعتاد، وربما تلتئم الجروح بشكل أبطأ من المعتاد.

نصائح: احرص على عدم تعرضك للجروح. ويمكنك إيقاف نزيف الأنف عن طريق الضغط على الأجزاء الطرية لأنفك لمدة عشر دقائق. هناك مراهم لا تحتاج إلى وصفة طبية قد تساعد من تخفيف آلام الشرج. وإذا استمر النزيف، استشر طبيبك. وكن منبهاً لنظافة فمك، واستخدم فرشاة أسنان ناعمة ومعجون أسنان خفيف. كن حذراً مع استخدام الخيط والعديد من المنتجات الخاصة بتنظيف ما بين الأسنان. أخبر طبيبك الأسنان أو أي مقدم رعاية صحية آخر عن علاجك لسرطان عند زيارتك له.

## الجلطة الدموية

قد تزداد خطورة الإصابة بجلطات الدم، وربما تُصاب بجلطة دموية في إحدى الساقين أو الذراعين، وقد يلحق هذا الدواء ألماً بهما ويصيبهما بالتورم أو الاحمرار.

## ارتفاع ضغط الدم

من الشائع الإصابة بارتفاع ضغط الدم. سيتم مراقبة ضغط دمك أثناء العلاج، وربما تحتاج إلى دواء.

## بروتين في البول

ربما تظهر بروتينات في البول، إلا أنها لا تتسبب في ظهور أية أعراض أخرى، وسيطلب منك تقديم عينة بول للتحقق من ذلك.

## تواصل مباشرة مع العيادة في حالة:

في حالة الطوارئ:

- اتصل بالرقم 112 في حالة استمرار ألم حاد في الصدر أو شعور بالضغط على الصدر أو صعوبة التنفس\ضيق التنفس.

اتصل بالعيادة الخاص بك على الفور في حال:

- حمى (درجة حرارة أعلى من 38 درجة) أو عند درجة حرارة أقل من 36 درجة
- التدهور الصحي المفاجئ بغض النظر عن الأعراض
- نزيف في الأنف أو نزيف آخر لا يمكنك إيقافه أو ظهور كدمات على أجزاء كبيرة من الجسم
- آلام شديدة و جديدة في منطقة البطن.

## نصائح حول عادات المعيشة

- أخبر طبيبك أو ممرضتك عن أسلوب حياتك المعتاد، ثم يمكنك الحصول على استشارة فردية بشأن النظام الغذائي والتمارين الرياضية والكحول والتبغ. وفيما يلي بعض النصائح العامة:
- من الضروري الحصول على الطاقة والتغذية التي يحتاجها جسمك، فهي تساعدك في الحفاظ على وزنك ومستويات الطاقة لديك، وتقلل من مخاطر الآثار الجانبية.
  - تساهم التمارين الرياضية في التخفيف من أعراض الإرهاق التي تصاحب المرض والعلاج، وكما تساعدك تمارين المشي والتمارين البدنية الشاقة في التخفيف من هذه الأعراض.
  - عليك تجنب تناول الكحول خلال أيام العلاج حيث أنها تؤثر على قدرة الكبد في التخلص من الأدوية.
  - يجب التوقف عن التدخين لأنه يساهم في زيادة خطر الإصابة بالسرطان مرة أخرى وإضعاف جهازك المناعي.

## معلومات عامة عن مرض السرطان

لمزيد من المعلومات حول مرض السرطان يرجى زيارة الموقع: Vårdguiden and Cancerfonden 1177

[www.1177.se](http://www.1177.se)

[www.cancerfonden.se](http://www.cancerfonden.se)

## ملاحظات

---

---