Entrektinib

for Lungcancer

الجدول الزمني للعلاج (يُقرأ الجدول من اليسار إلى اليمين)

يوم	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Entrektinib	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

يوم	22	23	24	25	26	27	28
Entrektinib	X	X	X	X	X	X	X

فيما يتعلق بعلاجك

يمنع إنتيركتينيب **Entrektinib** (روزليتريك) **(Rozlytrek)** البروتينات التي تنظم نمو الخلايا السرطانية وانقسامها، مما يؤدي إلى إبطائها.

تُؤخذ الكبسولات باستمرار مرة واحدة في اليوم دون انقطاع. ستتم مراقبة فحوصات الدم ورصد أي آثار جانبية أثناء فترة العلاج.

كيف تتناول الدواء

ابتلع الكبسولات كاملة بالماء. تناول الكبسولات بعد الأكل أو على معدة فارغة. إذا تقيأت بعد الجرعة مباشرة، فتناول جرعة أخرى. يجب ألا تأكل أو تشرب الجريب فروت أو مستحضرات تحتوي على الجريب فروت أو الرمان أثناء العلاج، لأن ذلك قد يؤثر على مفعول دواء الإنتريكتينيب. اقرأ المزيد في النشرة داخل العبوة

آثار جانبية – الأعراض ونصائح

الآثار الجانبية التي ندرجها هنا هي الأكثر شيوعا وأهمية. ويمكن أن تختلف اختلافا كبيرا من شخص لآخر، وحتى من وقت لآخر. وقد تحدد الآثار الجانبية جرعتك أو تستدعي التوقف عن تناول الدواء.

استشر طبيبك أو ممرضتك إذا عانيت من أي آثار جانبية، ففي كثير من الأحيان يمكن تجنب هذه الأعراض أو التخفيف من حدتها.

التعب

من الشائع الإحساس بالإرهاق والتعب وانخفاض معدلات الطاقة والشعور بعدم الراحة الجسدية، واضطرابات في الذاكرة، وقد تجد صعوبة في التركيز وحل المشكلات. وقد يجعلك هذا العلاج تشعر بالإحباط والتوتر والقلق، وربما تجد أيضا صعوبة في الاختلاط بالآخرين. وربما يستمر التعب والإرهاق لفترة طويلة بعد العلاج.

نصائح: حاول ممارسة التمارين الرياضية والتحرك لأنهما العاملان الوحيدان المعروفان للمساعدة في التخلص من التعب والإرهاق.

التغيرات الذهنية

التغيرات الذهنية شائعة و عادة ما تكون الأعراض خفيفة. يمكن أن تشعر بالإرتباك أو أنك مشوش، الإنفعال، الإضطراب، إكتآب و سوء قدرة الذاكرة.

قد تشعر بتعب ذهني و قلة اهتمام و صعوبة في القيام بأشياء متعددة في نفس الوقت. قد يحدث الصداع و الدوخة و تغيير في الإحساس أيضاً.

القابلية للعدوى الالتهابية

ستكون عرضة للإصابة بالعدوى بعد فترة العلاج بسبب انخفاض عدد كريات الدم البيضاء. وقبل كل علاج، تؤخذ عينة من الدم لمعرفة ما إذا كانت خلايا الدم قد تعافت. وإذا كانت القيم منخفضة جداً، يجب تأجيل العلاج او تخفيف الجرعة.

نصائح: حاول على سبيل المثال تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص المصابين بالزكام أو أمراض المعدة، واغسل يديك كثيرا بالماء والصابون. وربما يكون معقم اليدين مفيدا في مثل هذه الحالات.

ألم في العضلات والمفاصل

من الشائع حدوث ألم في العضلات والمفاصل.

الصداع

من المعتاد الإصابة بصداع.

مشكلات في العينين

قد تشعر باضطرابات بصرية مع ازدواجية الرؤية و ربما رؤية ومضات من الضوء. وقد تصاب أيضا بتشوش الرؤية وتصبح أكثر حساسية للضوء. عليك مراجعة طبيبك إذا ظهرت عليك مثل هذه الأعراض.

نصيحة: إذا شعرت بوخز في عينيك وعانيت الجفاف، استخدم قطرات مرطبة للعين متوفرة في الصيدليات.

مشاكل في المعدة والأمعاء

من الشائع الإصابة بالإمساك، وربما تُصاب أيضا بالإسهال.

نصائح: تناول كمية من الماء أكثر من المعتاد يومياً. وإذا كنت مصابا بالإمساك، فحاول تناول الأطعمة الغنية بالألياف وممارسة التمارين الرياضية. وإذا كنت تعاني من الإسهال، فعليك تجنب الأطعمة الدهنية والحادة والغنية بالألياف. استشر طبيبك عند إصابتك بالإسهال أو الإمساك – فربما تحتاج إلى علاج.

الغثيان وتغير حاسة التذوق

هناك خطر الشعور بالتوعك نتيجة العلاج. سيتم إعطاؤك أدوية مضادة للغثيان في حالة الضرورة.

نصائح: في بعض الأحيان يكون من الأفضل تناول وجبات خفيفة وحصص صغيرة من الطعام. فعلى سبيل المثال، عليك محاولة تناول اللبن المخثر واللبن الزبادي وعجة البيض والسندويشات والشوربات الساخنة أو الباردة. كما إن تناول كمية قليلة من الماء بين الوجبات قد يقلل من حدة الغثيان.

تواصل مباشرة مع العيادة في حالة:

في حالة الطوارئ:

- **اتصل بالرقم 112 في حالة استمرار ألم حاد في الصدر أو شعور بالضغط على الصدر أو صعوبة التنفس/ضيق التنفس.**

اتصل بالعيادة الخاص بك على الفور في حال:

- **التدهور الصحي المفاجئ بغض النظر عن الأعراض**
- **الإسهال الشديد الذي لا يقل مع التوقف عن تناول الأدوية**
- **طفح جلدي في معظم أنحاء الجسم، أو طفح جلدي مع الألم.**
- **احمرار مؤلم في الجلد / طفح جلدي / تغيرات في الأظافر**

نصائح عامة

يُوصى بتجنب الحمل أو التسبب في أن تحمل المرأة أثناء علاجك بأدوية السرطان، لأن الأدوية قد تؤثر على الجنين. ولذلك، يُوصى باستخدام وسائل آمنة لمنع الحمل. وفي بعض الأحيان تكون هناك حاجة إلى حماية مزدوجة، لأن الآثار الجانبية كالإسهال أو التأثير المباشر لأدوية السرطان قد تعني أن حبوب منع الحمل لا توفر حماية كافية بمفردها.

معلومات عامة عن مرض السرطان

لمزيد من المعلومات حول مرض السرطان يرجى زيارة الموقع: Vårdguiden and 1177 Cancerfonden

www.1177.se

www.cancerfonden.se