Datum: _____

Läkare: _____

Kur nr: _____

Längd (cm): _____ **Vikt (kg):** _____

Yta (m^2): _____ **Aktuellt GFR:** _____

Patientdata (namn och personnr)

Beställande enhet, sjukhus, tel. & fax, kundnr

Antitumoral regim - Lungcancer

RegimID: NRB-2635

Mitoxantron intraperikardiellt

Ordination/Administrering

Dag	1
Mitoxantron Intraperikardiell instillation 10 mg (standarddos)	x1

Lågemetogen.
Antiemetika enligt lokal instruktion. _____

Villkor och kontroller för administration Mitoxantron 10 mg blandas i 20 ml Natriumklorid 9 mg/ml.

Anvisningar för ordination
Kateter läggs in i perikardiet, exsudat tappas ut. Efter instillation av Mitoxantron, spolas katetern med 10 ml isoton Natriumklorid.

Katetern hålls stängd i 1-2 timmar. Därefter tappas vätskan ut och katetern avlägsnas.

Behandlingen kan vid behov upprepas.

Antiemetika
Ingen rutinmässig behandling

DAG 1 Datum_____ Beställs till kl____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Mitoxantron** _____ **mg** _____ _____
   Ges intraperikardiellt
   (Ges intraperitoniellt enl anvisningar för ordination)