

Datum: _____
Läkare: _____
Kur nr: _____
Längd (cm): _____ **Vikt (kg):** _____
Yta (m²): _____ **Aktuellt GFR:** _____

Patientdata (namn och personnr)

Beställande enhet, sjukhus, tel. & fax, kundnr

Antitumoral regim - Lungcancer

RegimID: NRB-2635

Mitoxantron intraperikardiellt**Ordnation/Administrering**

Dag	1
Mitoxantron Intraperikardiell instillation 10 mg (standarddos)	x1

Lågemetogen.

Antiemetika enligt lokal instruktion. _____

Villkor och kontroller för administration

Mitoxantron 10 mg blandas i 20 ml Natriumklorid 9 mg/ml.

Anvisningar för ordination

Kateter läggs in i perikardiet, exsudat tappas ut. Efter instillation av Mitoxantron, spolas katetern med 10 ml isoton Natriumklorid.

Katetern hålls stängd i 1-2 timmar. Därefter tappas vätskan ut och katetern avlägsnas.

Behandlingen kan vid behov upprepas.

Antiemetika

Ingen rutinmässig behandling

DAG 1 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. Mitoxantron _____ mg

Ges intraperikardiellt

(Ges intraperitoniellt enl anvisningar för ordination)