Antitumoral regim - Lungcancer

RegimID: NRB-2635

Mitoxantron intraperikardiellt

Översikt

Läkemedel

Substans	Administrering	Spädning	Infusionstid	Grunddos/ admtillfälle	Beräkningssätt	Maxdos/ admtillfälle	Max ack. dos
1. Mitoxantron	Intraperikardiell instillation			10 mg	standarddos		

Regimbeskrivning

Dag	1
1. Mitoxantron Intraperikardiell instillation 10 mg	x1

Emetogenicitet: Låg

Behandlingsöversikt
Vid malignt perikardexsudat.

Anvisningar för regimen

Villkor och kontroller för administration
Mitoxantron 10 mg blandas i 20 ml Natriumklorid 9 mg/ml.

Anvisningar för ordination
Kateter läggs in i perikardiet, exsudat tappas ut. Efter instillation av Mitoxantron, spolas katetern med 10 ml isoton Natriumklorid.

Katetern hålls stängd i 1-2 timmar. Därefter tappas vätskan ut och katetern avlägsnas.

Behandlingen kan vid behov upprepas.

Antiemetika
Ingen rutinmässig behandling

Biverkningar

Mitoxantron

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet Enligt studie har endast enstaka patient fått mild leukopeni.		
Hjärttoxicitet Enligt studie var exklusionskriterier: verifierad kardiomyopati, icke behandlad hjärtsvikt och uttalad arytmi. Således saknas kunskap om eventuella biverkningar hos sådana patienter.		
Gastrointestinal påverkan Enligt studie enstaka patient upplevt aptitnedgång under några veckor efter instillation.		
Starkt vävnadsretande		

Referenser

Musch E et al. Intrapericardial Instillation of Mitoxantrone in Palliative Therapy of Malignant Pericardial Effusion. Onkologie 2003;26:135-139.

Versionsförändringar

Version 1.2
ny antiemtikalänk

Version 1.1
Lagt till Flödesschema Dag 1