

Antitumoral regim - Lymfom

RegimID: NRB-1954

BEACOPP 14

Diagnoskod: C81

Kurintervall: 14 dagar

Översikt

Läkemedel

| Substans | Admini- strering | Spädning | Infusions- tid | Grunddos/ admtillfälle | Beräk- ningssätt | Maxdos/ admtillfälle | Max ack. dos |
|--------------------------------|------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1. Cyklofosamid- monohydrat | Intravenös infusion | 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml infusion | 30 min. | 650 mg/m ² | kroppsyta | | |
| 2. Doxorubicin | Intravenös infusion | 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml infusion | 30 min. | 25 mg/m ² | kroppsyta | | 550 mg/m ² |
| 3. Etoposid | Intravenös infusion | 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml infusion | 1 tim. | 100 mg/m ² | kroppsyta | | |
| 4. Prokarbazin | Peroral kapsel | | | 100 mg/m ² | kroppsyta | | |
| 5. Prednison | Peroral tablett | | | 80 mg/m ² | kroppsyta | | |
| 6. Vinkristin | Intravenös infusion | 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml infusion | 5 min. | 1,4 mg/m ² | kroppsyta | 2 mg | |
| 7. Bleomycin | Intravenös infusion | 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml infusion | 30 min. | 10 000 IE/m ² | kroppsyta | 30 000 E | 300 000 E |
| 8. Filgrastim | Subkutan injektion | | | 0,5 ME/kg | kroppsvikt | | |

Regimbeskrivning

| Dag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Ny kur dag 15 |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------|
| 1. Cyklofosamidmonohydrat Intravenös infusion 650 mg/m ² | x1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Doxorubicin Intravenös infusion 25 mg/m ² | x1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Etoposid Intravenös infusion 100 mg/m ² | x1 | x1 | x1 | | | | | | | | | | | | |
| 4. Prokarbazin Peroral kapsel 100 mg/m ² | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | | | | | | | | |
| 5. Prednison Peroral tablett 80 mg/m ² | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | | | | | | | | |
| 6. Vinkristin Intravenös infusion 1,4 mg/m ² | | | | | | | | x1 | | | | | | | |
| 7. Bleomycin Intravenös infusion 10 000 IE/m ² | | | | | | | | x1 | | | | | | | |
| 8. Filgrastim Subkutan injektion 0,5 ME/kg | | | | | | | | | x1 | x1 | x1 | x1 | | | |

Emetogenicitet: Medel

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen

Under hela behandlingen och t.o.m 1 månad ge profylax mot herpes och svamp, mot pneumocystis profylax i 3 månader. Kontroll av blod-, lever- och elektrolytstatus med kreatinin.

Villkor och kontroller för administration

Kontroll av B-glukos.

Anvisningar för ordination

Kontroll av blod-, lever- och elektrolytstatus med kreatinin.

G-CSF dos 0,5 ME/kg och dygn, ges med start dag 9 (minst 24 timmar efter avslutad bleomycininfusion) i 4 dygn eller tills LPK >10.

Dosen för prednison avrundas med fördel till hela eller halva tabletter (styrka 50 mg).

Etoposid dag 2 och 3 kan också ges peroralt. Dosen är då 200 mg/m² per dag (biotillgänglighet cirka 50 %).

Dosjustering rekommendation

Etoposid - Vid P/S-albumin < 30 g/L reduceras dosen till 75 % pga högre biotillgänglighet. Vid GFR < 30 ml/min reduceras dosen till 75%.

Övrig information

Inbördes ordning av de olika substanserna är valfri.

Doxorubicin och cyklofosamid är blandbara i samma infusion.

Prokarbazin = Natulan kapsel 50 mg, licenspreparat.

Biverkningar

Cyklofosamidmonohydrat

| Observandum | Kontroll | Stödjande behandling |
|--|--------------|--------------------------|
| Hematologisk toxicitet Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos. | Blodvärden | Enligt lokala riktlinjer |
| Cystit Hemorragisk cystit förekommer, kan bli allvarlig. Dosberoende. Strålbehandling mot blåsa ökar risk. Hydrering viktigt. Eventuellt Mesna som profylax, följ vårdprogram eller behandlingsprotokoll. Enligt ASCO ges Mesna endast vid högdos cyklofosamid, i Up to Date angivet som 50mg/kg eller 2g/m ² . Barn har angett doser över 1 g/m ² som behov av Mesna profylax. | Monitorering | Hydrering Mesna |
| Hög emetogenicitet Illamående, kräkning vanligt vid högre doser iv (mer än 1500 mg). Antiemetika enligt riktlinjer. | Monitorering | Antiemetika |
| Tumörlyssyndrom Tumörlyssyndrom kan uppstå till följd av snabb lys av tumörceller vid vissa sjukdomar under vissa förutsättningar (exempelvis vanligast i uppstartsbehandling). Viktigt att patient är väl hydrerad och har god diures. Som skydd ges eventuellt Allopurinol under behandlingstiden. Vid behov kan antidoten rasburikas (Fasturtec) ges. | Urat | Hydrering Allopurinol |
| Hudtoxicitet Alopeeci (håravfall) förekommer. | | |
| Interaktionsbenägen substans Cyklofosamid aktiveras och metaboliseras via CYP450 systemet. Samtidig administrering av cyklofosamid med CYP450-inducerare kan öka koncentrationen av cytotoxiska metaboliter av cyklofosamid. (Exempel på CYP450-inducerare är: rifampicin, fenobarbital, karbamazepin, fenytoin, johannesört och kortikosteroider.) Samtidig administrering av cyklofosamid med CYP450-hämmare kan minska aktiveringen av cyklofosamid och därmed minska effekten. (Exempel på CYP450-hämmare är: amiodaron, aprepitant, bupropion, busulfan, ciprofloxacin, flukonazol, itraconazol, ketokonazol, klaritromycin, posakonazol, prasugrel, sulfonamider, telitromycin, tiotepa, vorikonazol.) Samtidig administrering av cyklofosamid med allopurinol, cimetidin eller hydroklortiazider kan via hämrad nedbrytning eller minskad njurutsöndring ge ökad koncentration av toxiska metaboliter. Ytterligare ett antal möjliga interaktioner eller farmakodynamiska interaktioner finns angivna, se FASS. Bland annat omnämns risk för ökade toxiska effekter vid kombination med: Antracykliner, cytarabin, trastuzumab (kardiologisk toxicitet), ACE-hämmare, natalizumab, paklitaxel, zidovudin (hematologisk toxicitet), azatioprin (levertoxicitet), amfotericin B (njurtoxicitet), amiodarone, G-CSF, GM-CSF (lungtoxicitet), tamoxifen (tromboemboliska effekter). | | |
| Extravasering Grön Ej vävnadsskadande (låg eller minimal risk för vävnadsskada vid extravasering). | | |

Doxorubicin

| Observandum | Kontroll | Stödjande behandling |
|--|---------------|--------------------------|
| Hematologisk toxicitet Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos. | Blodvärden | Enligt lokala riktlinjer |
| Hjärttoxicitet Risk för antracyklininducerad kardiomyopati med hjärtsvikt. Kan uppstå sent i behandlingen eller lång tid efteråt. Risken ökar vid tidigare hjärtsjukdom, strålbehandling mot del av hjärtat eller tidigare behandling med andra antracykliner eller antracenedioner (additiv toxicitet). Kumulativ dos på 550mg/m ² bör ej överstigas, vid strålbehandling mot mediastinum eventuellt lägre. Utgångsvärde på LVEF (vänsterkammarmfunktion) bör finnas, eventuell upprepade mätningar, om symtom på försämrad LVEF överväg avbrytande av behandling. | Hjärtfunktion | |
| Gastrointestinal påverkan Mucosit/stomatit förekommer. Illamående, kräkningar och diarré förekommer. | | |
| Levertoxicitet Förhöjda levervärden finns rapporterat. Eventuellt dosreduktionsbehov utifrån bilirubinvärde, se FASS. | Leverfunktion | |
| Tumörlyssyndrom Tumörlyssyndrom kan uppstå till följd av snabb lys av tumörceller vid vissa sjukdomar under vissa förutsättningar (exempelvis vanligast i uppstartsbehandling). Viktigt att patient är väl hydrerad och har god diures. Som skydd ges eventuellt Allopurinol under behandlingstiden. Vid behov kan antidoten rasburikas (Fasturtec) ges. | Urat | Hydrering Allopurinol |
| Starkt vävnadsretande Antracykliner skall ges via central infart. | | |

Fortsättning på nästa sida

Doxorubicin (Fortsättning)

| Observandum | Kontroll | Stödjande behandling |
|-----------------------------|----------|--------------------------------|
| Extravasering Röd | | Kyla Dexrazoxan DMSO |

Vävnadstoxisk - risk för nekros (hög risk för vävnadsskada).
Vid behov följ instruktion för kylbehandling, se stöddokument Extravasering.
Vid konstaterad extravasering av antracykliner överväg behandling med Dexrazoxan (Savene), se regim Dexrazoxan. Eventuell kylbehandling som startats i väntan på Dexrazoxan skall avslutas minst 15 minuter före Dexrazoxan påbörjas. Om Dexrazoxan helt saknas, eller inte kan startas inom 6 timmar, överväg DMSO behandling, se stöddokument Extravasering.

Etoposid

| Observandum | Kontroll | Stödjande behandling |
|---|---------------------|--------------------------|
| Akut infusionsreaktion/anafylaxi | Puls Blodtryck | Akutberedskap |
| Hematologisk toxicitet | Blodvärden | Enligt lokala riktlinjer |
| Hudtoxicitet | | |
| Gastrointestinal påverkan | Biverkningskontroll | Antiemetika |

Anafylaktiska reaktioner kan förekomma. Infusionen ska ges långsamt, under 30-60 minuter för att undvika hypotension och bronkospasm.

Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.

Hårfall/alopeci vanligt, reversibel.

Illamående och kräkningar vanliga. Förstoppning och diarré förekommer.

Övrigt

Vid serum-albumin <30 överväg 75-80 % dos Etoposid.

Lågt serum-albumin ger ökad obundet/fritt Etoposid AUC, vilket resulterar i ökad hematologisk toxicitet (lägre antal neutrofila).

| | | |
|------------------------------------|--|-------|
| Extravasering Gul | | Värme |
|------------------------------------|--|-------|

Vävnadsretande, men ger sällan allvarlig skada (medelhög risk för vävnadsskada).

Irriterande vid extravasering. Kan ge lokal mjukdelstoxicitet, irritation och inflammation så som svullnad, smärta, cellulit.

Följ instruktionen för värmebehandling, se stöddokument Extravasering.

Interaktionsbenägen substans

Samtidig administrering av högdos ciklosporin med Etoposid ger ökad exponering för Etoposid till följd av minskad clearance.

Samtidig administrering av cisplatin med Etoposid är förknippat med ökad exponering för Etoposid till följd av minskad clearance.

Samtidig administrering av fenytoin med Etoposid är förknippat med minskad effekt av Etoposid till följd av ökad clearance. Även andra enzyminducerande antiepileptika kan ge minskad effekt av Etoposid, se FASS.

Samtidig administrering av antiepileptiska mediciner med Etoposid kan medföra risk för sämre effekt av antiepileptisk medicin, dock vaga uppgifter, se FASS.

Samtidig administrering av warfarin med Etoposid kan ge ökad effekt warfarin och därmed förhöjda PK/INR värden, vilket kräver ökad övervakning.

Samtidig administrering av netupitant/palonosetron (där netupitant metaboliseras via CYP3A4) med Etoposid har visat att exponeringen för Etoposid ökar med 21%. I poolade säkerhetsdata från fyra studier av olika storlekar har kombinationen dock hittills ej visat klinisk effekt med ökad toxicitet, enligt dokument från företaget.

Prokarbazin

| Observandum | Kontroll | Stödjande behandling |
|----------------------------------|----------|----------------------|
| Hematologisk toxicitet | | |
| Gastrointestinal påverkan | | |

Leukopeni, trombocytopeni, reversibel påverkan finns angiven, osäkert hur vanligt.

Illamående, kräkning, minskad aptit, mycket vanligt, men oftast övergående.

Fortsättning på nästa sida

Prokarbazin (Fortsättning)

| Observandum | Kontroll | Stödjande behandling |
|--|----------|----------------------|
| Övrigt Azoospermia och ovariedysfunktion finns rapporterat (eventuellt vid kombination med kemoterapi), kan vara irreversibel. | | |
| Övrigt Undvik alkohol då prokarbazin kan ha en disulfiram (Antabus) liknande effekt. Prokarbazin är en svag MAO hämmare vilket kan ge interaktioner med mat med hög tyraminhalt och ge risk för hypertoni. Det är dock ovanligt med reaktioner, men man kan undvika (åtminstone stora doser av) mögelost, övermogen frukt, fermenterade grönsaker, fermenterad korv (t ex salami), jästextrakt och sojasås/sojabönprodukter. | | |
| Interaktionsbenägen substans Anses vara en svag MAO-hämmare. Samtidig administrering av antidepressiva (särskilt tricykliska ämnen) och centralstimulantia (metylfenidat och selegilin) med prokarbazin kan ge ökad risk för serotonergt syndrom. Samtidig administrering av antipsykotika (fentiazin, thiopental) med prokarbazin kan ge ökade biverkningar av antipsykotika så som CNS depression. Samtidig administrering av Clozapin med prokarbazin kan öka risk för agranulocytos. Samtidig administrering av enzym-inducerande antiepileptika kan öka risk för allergisk reaktion (hypersensitivity) av prokarbazin. Samtidig administrering av hypertoni medicin med prokarbazin kan ge ökad effekt av hypertoni medicin. Samtidig administrering av antihistaminer för systemiskt bruk med prokarbazin och risk för CNS-depression (mekanism okänd), detta är en tidigare uppgift från regimbibliotekets text, men verifieras ej i SmPC eller Lexicomp, osäker uppgift. | | |

Prednison

| Observandum | Kontroll | Stödjande behandling |
|---|----------|----------------------|
| Hudtoxicitet Kan ge skör hud inklusive lättutlösta blåmärken, försämrad sårhäkning. Psoriasis kan förvärras även av kortvarigt intag av höga doser kortikosteroider. | | |
| Gastrointestinal påverkan Vaga uppgifter, möjligen förekommer magsår. | | |
| Endokrinologi Möjligt med kortvariga svängningar av blodsockernivåer hos diabetiker. Hypokalemi och Natriumretention förekommer, osäkert om det krävs långvarig behandling. | | |
| CNS påverkan Upprymdhet, sömnsvärighet förekommer. Även irritabilitet, deprimerade och labila sinnestämningar förekommer. | | |

Vinkristin

| Observandum | Kontroll | Stödjande behandling |
|--|---------------------|----------------------|
| Akut infusionsreaktion/anafylaxi Bronkospasm, andnöd finns rapporterat. Framför allt risk vid kombination med mitomycin. | | Akutberedskap |
| Gastrointestinal påverkan Förstoppning vanligt. Överväg profylaktiska åtgärder. | | |
| Neuropati Både akut övergående neuropati (motorisk och sensorisk) och risk för kumulativ bestående neurotoxicitet. Försiktighet vid redan känd neurologisk sjukdom. Fallrapporter finns om svåra neurologiska symtom efter enstaka doser hos personer med exempelvis Charcot-Marie-Tooth (även att neurologisk diagnos uppenbarats efter behandlingsstart vinkristin). Försiktighet även vid känd leverskada, då toxicitetsgrad kan öka. | Biverkningskontroll | |
| Starkt vävnadsretande Lösningen är frätande. Endast för intravenös användning, i infusionspåse, aldrig injektions spruta p.g.a. förväxlingsrisk. Fatal vid intratekal administrering, se FASS. | | |

Fortsättning på nästa sida

Vinkristin (Fortsättning)

| Observandum | Kontroll | Stödjande behandling |
|---|----------|----------------------|
| Extravasering | | Värme |
| Röd | | Hyaluronidas |
| <p>Vävnadstoxisk, risk för nekros (hög risk för vävnadsskada).</p> <p>Central infart rekommenderas.</p> <p>Räknas som vesicant non DNA binding. Tillhör vinkaalkaloider.</p> <p>Följ instruktionen för värmebehandling, se stöddokument Extravasering.</p> <p>Överväg lokal behandling med Hyaluronidas.</p> | | |
| <p>Interaktionsbenägen substans</p> <p>Metaboliseras via CYP3A.</p> <p>Samtidig administrering av andra läkemedel som hämmar CYP3A kan öka koncentration av vinkaalkaloiden och därmed ge allvarligare biverkningar och snabbare uppträdande av dem.</p> <p>Samtidig administrering av mitomycin kan ge ökade biverkningar, framför allt andnöd/bronkospasm.</p> | | |

Bleomycin

| Observandum | Kontroll | Stödjande behandling |
|--|---------------------|----------------------|
| Akut infusionsreaktion/anafylaxi | Biverkningskontroll | |
| <p>Feber och frossa infusionsdagen är vanligt, oftast endast symtomatiskt.</p> | | |
| <p>CAVE syrgas</p> <p>Ökar risk för lungtoxicitet. Reducering av syrgasbehandling vid operation.</p> | | |
| <p>Andningsvägar</p> <p>Interstitiell pneumoni. Dos- och åldersrelaterad när totaldosen överstiger 300 000 IE. Andningsbesvär eller auskultatoriska biljud bör föranleda utredning och paus i behandlingen tills orsak klarlagd. Bredspektrumantibiotika och kortikosteroider ges frikostigt vid misstanke. Ökad risk även vid lägre doser vid hög ålder, strålbehandling av thorax, nedsatt njurfunktion, andra lungsjukdomar, hög syrgastillförsel (exempelvis vid operation), thoraxkirurgi.</p> | | |
| Hypotension | Blodtryck | |
| <p>Ortostatisk hypotension, överväg adekvat behandling.</p> | | |
| <p>Hudtoxicitet</p> <p>Kan ge övergående, långvarig hyperpigmentering/missfärgning av huden.</p> | | |
| <p>Extravasering</p> | | |
| Grön | | |
| <p>Ej vävnadsskadande (låg eller minimal risk för vävnadsskada vid extravasering).</p> | | |

Filgrastim

| Observandum | Kontroll | Stödjande behandling |
|--|----------|----------------------|
| <p>Andningsvägar</p> <p>Pulmonella biverkningar, framförallt interstitiell pneumoni, har rapporterats efter administrering av G-CSF. Hos patienter som nyligen haft lunginfiltrat eller pneumoni kan risken vara större. Debut av pulmonella symtom som hosta, feber och dyspné i förening med radiologiska fynd såsom lunginfiltrat eller nedsatt lungfunktion kan vara begynnande tecken på akut andningssvikt (ARDS).</p> | | |
| Smärta | | Paracetamol |
| <p>Muskuloskeletal smärta inklusive ryggsmärta vanlig.</p> | | |
| <p>Övrigt</p> <p>Aortit, rapporter om sällsynta fall. Symtom som feber, buksmärta, sjukdomskänsla, ryggsmärta och förhöjda inflammationsmarkörer.</p> <p>Kapillär-läckagesyndrom har rapporterats, utmärks av hypotoni, hypoalbuminemi, ödem och hemokonzentration.</p> <p>Mjältruptur har rapporterats sällsynt. Överväg diagnos om smärta vänster övre kvadrant buk</p> <p>Glomerulonefrit har rapporterats, reversibel vid dossänkning eller utsättning.</p> | | |

Versionsförändringar**Version 2.0**

Ny version gjord (arkiverad)

Version 2.NA

Lagt till information för Etoposid och dosreduktion vid lågt P/S-albumin och lågt GFR. Lagt till kontroller inför start av regim och inför ordination.