

Datum: \_\_\_\_\_

Patientdata (namn och personnr)

Läkare: \_\_\_\_\_

Kur nr: \_\_\_\_\_

Beställande enhet, sjukhus, tel. &amp; fax, kundnr

Längd (cm): \_\_\_\_\_

Vikt (kg): \_\_\_\_\_

Yta (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_

Aktuellt GFR: \_\_\_\_\_

Antitumoral regim - Lymfom

Behandlingsavsikt: Remissionssyftande

**Bendamustin 120**

RegimID: NRB-2811

Kurintervall: 21 dagar

**Ordination/Administrering**

Dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Ny kur dag 22
Bendamustin Intravenös infusion 120 mg/m <sup>2</sup>	x1	x1																				

Medelemetogen.

Antiemetika enligt lokal instruktion. \_\_\_\_\_

**Anvisningar för ordination**

Vid låg tumörbörda och indolent lymfom undviks allopurinol.

**DAG 1** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml  
*Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet* \_\_\_\_\_
- Tablett/Injektion Antiemetika  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_
- Bendamustin \_\_\_\_\_ mg** 30 min. \_\_\_\_\_  
i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml  
Ges intravenöst under 30 min. \_\_\_\_\_

**DAG 2** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml  
*Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet* \_\_\_\_\_
- Tablett/Injektion Antiemetika  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_
- Bendamustin \_\_\_\_\_ mg** 30 min. \_\_\_\_\_  
i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml  
Ges intravenöst under 30 min. \_\_\_\_\_