

Datum: _____

Patientdata (namn och personnr)

Läkare: _____

Kur nr: _____

Längd (cm): _____

Vikt (kg): _____

Yta (m²): _____

Aktuellt GFR: _____

Beställande enhet, sjukhus, tel. & fax, kundnr

Antitumoral regim - Lymfom**FC intravenös (Cyklofosfamid-Fludarabin i.v.)**

Indikation: KLL-kronisk lymfatisk leukemi C91.1

Kurintervall: 28 dagar

Behandlingsavskikt: Remissionssyftande

RegimID: NRB-320

Ordination/Administrering

Dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Fludarabin Intravenös infusion 25 mg/m ²	x1	x1	x1																		
Cyklofosfamidmonohydrat Intravenös infusion 250 mg/m ²	x1	x1	x1																		

Dag	22	23	24	25	26	27	28	Ny kur dag 29
Fludarabin Intravenös infusion 25 mg/m ²								
Cyklofosfamidmonohydrat Intravenös infusion 250 mg/m ²								

Medeletogen.

Antiemetika enligt lokal instruktion. _____

Anvisningar för ordination

Vid stor tumörbörlahydrering och alkalinisering av urinen.

Dosreduktion sker i första hand genom att minska antalet behandlingsdagar.

DAG 1 Datum_____ Beställs till kl_____ Avvakta ja nej Inf. tid Klockan Ssk. sign Läk. sign

1. 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml
Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet _____
2. Tablett/Injektion Antiemetika

3. **Fludarabin** _____ mg
i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml
Ges intravenöst under 30 min. 30 min. _____ _____
4. **Cyklofosfamidmonohydrat** _____ mg
i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml
Ges intravenöst under 30 min. 30 min. _____ _____

DAG 2 Datum_____ Beställs till kl_____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml
Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet
2. Tablett/Injektion Antiemetika

3. **Fludarabin** _____ mg 30 min.
 i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml
 Ges intravenöst under 30 min.
4. **Cyklofosfamidmonohydrat** _____ mg 30 min.
 i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml
 Ges intravenöst under 30 min.

DAG 3 Datum_____ Beställs till kl_____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml
Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet
2. Tablett/Injektion Antiemetika

3. **Fludarabin** _____ mg 30 min.
 i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml
 Ges intravenöst under 30 min.
4. **Cyklofosfamidmonohydrat** _____ mg 30 min.
 i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml
 Ges intravenöst under 30 min.