Glofitamab kur 2-12

vid Hematologisk malignitet

Schema för regimen

Ny kur dag 22

Dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Glofitamab	X																				

Om din behandling

Obinutuzumab och glofitamab är en antikroppar som aktiverar ditt immunförsvar att angripa cancercellerna.

Du får en startdos (kur 1) med dropp dag 1 (obinutuzumab) dag ,8 och 15 (gliofitamab).

Därefter får du dropp (gliofitamab) dag 1 och sedan uppehåll i 20 dagar i återkommande kurer. Du kan också få läkemedel för att förebygga biverkningar, till exempel antibiotika och medel mot herpesinfektion. Under behandlingen följs dina blodprover och eventuella biverkningar.

Cytokinfrisättningssyndrom (CRS)

Biverkningarna kan vara allvarliga och beror på att läkemedlet aktiverar immunceller som kan producera cytokiner, cytokinfrisättningssyndrom (CRS). Störst risk för biverkningar är under de första behandlingarna. Vid de första doserna krävs att man stannar en längre tid på sjukhus för övervakning, ibland även över natten. Symtom på CRS är lågt blodtryck, yrsel och ostadighetskänsla, feber och frossa, huvudvärk illamående och kräkningar.

Förutom de akuta biverkningarna kan du få andra biverkningar. De vi listar här är de vanligaste och viktigaste. De kan variera mycket mellan olika personer. Berätta för din läkare eller sjuksköterska om du har biverkningar. Ofta kan besvären förebyggas eller lindras.

Biverkningarna kan komma sent, flera månader efter att behandlingen är avslutad. Kontakta då ändå din klinik!

Lågt blodtryck, yrsel och svimning

Du kan få lågt blodtryck som gör att du lätt blir yr och kan svimma. Risken är störst i början av behandlingen. Tänk på risken för svimning när du handhar farliga maskiner eller kör bil.

Trötthet - Fatigue

I samband med cancersjukdom och behandling är det vanligt att känna trötthet. Det är individuellt hur svåra besvär du upplever och hur länge det håller i sig. Du kan vara trött lång tid efter att en behandling har avslutats. Sjuklig trötthet kallas fatigue och är trötthet som inte alltid förbättras efter vila och sömn. Många upplever fatigue som total energilöshet, och den kan komma även om du inte anstränger dig. Din förmåga att minnas, koncentrera dig och lösa problem kan bli sämre. Fatigue är ibland kopplat till uppgivenhet, stress, oro och depression.

Tips: Rör gärna på dig. Fysisk aktivitet hjälper ofta mot trötthet och fatigue. Hitta en balans mellan aktivitet, vila och sömn som fungerar för dig.

Besvär med mage och tarm

Diarré och illamående är vanligt, men du kan även bli förstoppad.

Du kan också få inflammation i tarmarna (kolit). Det kan ge kraftig diarré, magsmärta, blod i avföringen eller mörk och illaluktande avföring.

Besvär med huden

Torr hud och klåda med eller utan hudutslag är vanligt. Vissa hudsjukdomar kan försämras av behandlingen, till exempel psoriasis och rosacea. Du kan även få inflammation i huden (dermatit), som i ovanliga fall kan leda till en allvarlig hudreaktion med vätskande sår.

Tips vid lindrig klåda: När du tvättar huden, var varsam och använd oparfymerad tvål eller duscholja. Smörj med mjukgörande kräm.

Huvudvärk

Huvudvärk är vanligt.

Kontakta genast din klinik vid:

Akut

Ring 112 vid ihållande akut bröstsmärta, tryck över bröstet eller svårt att andas/andnöd

Ring genast din klinik vid:

- Feber (temp över 38 grader) eller vid temp under 36 grader eller frossa
- Plötslig försämring oavsett symtom, till exempel yrsel eller svimningskänsla
- Vid infektionssymtom från urinvägar eller förkylningssymtom innan du ska få behandling
- Om du eller dina anhöriga upplever att du är förändrad, förvirrad eller att medvetandet påverkas, är slö, får krampar eller skakningar
- Kraftig diarré som inte minskar med stoppande läkemedel
- Illamående och kräkningar
- Kraftig huvudvärk

Kontakta din klinik före vaccination

Om du behöver vaccinera dig, prata med din läkare eller sjuksköterska innan.

Allmänna råd

Det är viktigt att inte bli gravid eller göra någon gravid när du behandlas med cancerläkemedel, eftersom läkemedlen kan påverka fostret. Använd därför säkra preventivmedel. Ibland behövs dubbelt skydd, biverkningar som diarré eller direkt påverkan av cancerläkemedel kan göra att P-piller inte räcker som ensamt skydd.

Allmän information och råd om cancer

Bra information om cancer finns hos både 1177 och Cancerfonden. För allmänna råd och stöd kontakta Cancerrådgivningen