

Datum: _____

Läkare: _____

Kur nr: _____

Längd (cm): _____ Vikt (kg): _____

Yta (m²): _____ Aktuellt GFR: _____

Patientdata (namn och personnr)

Beställande enhet, sjukhus, tel. & fax, kundnr

Antitumoral regim - Lymfom

Karmustin-Tiotepa (BCNU-Tiotepa)

Indikation: CNS-lymfom C83.3

Behandlingsavsikt:

RegimID: NRB-1329

Ordination/Administrering

Dag	1	2	3	4	5	6	7	8
Karmustin Intravenös infusion 400 mg/m ²	x1							
Tiotepa Intravenös infusion 5 mg/kg		x2	x2					
Infusion av stamceller Intravenös infusion NA ml								x1

Högemetogen.

Antiemetika enligt lokal instruktion. _____

Anvisningar för ordination

Högemetogent dag 1, medelemetogent dag 2-3.

DAG 1 Datum_____ Beställs till kl_____ Avvakta ja nej Inf. tid Klockan Ssk. sign Läk. sign

1. 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml
Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet

2. Tablett/Injektion Antiemetika

3. Karmustin _____ mg
i 500 ml Glukos 50 mg/ml
Ges intravenöst under 2 tim.

2 tim.

DAG 2	Datum_____	Beställs till kl_____	Avvakta ja nej	Inf. tid	Klockan	Ssk. sign	Läk. sign
1.	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml <i>Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet</i>					_____	_____
2.	Tablett/Injektion Antiemetika _____ _____					_____	_____
3.	Tiotepa _____ mg i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 2 tim.			2 tim.		_____	_____
4.	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml <i>Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet</i>					_____	_____
5.	Tablett/Injektion Antiemetika _____ _____					_____	_____
6.	Tiotepa _____ mg i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 2 tim. <i>((Startas 12 timmar efter föregående start av Tiotepa-infusion.))</i>			2 tim.		_____	_____

DAG 3	Datum_____	Beställs till kl_____	Avvakta ja nej	Inf. tid	Klockan	Ssk. sign	Läk. sign
1.	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml <i>Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet</i>					_____	_____
2.	Tablett/Injektion Antiemetika _____ _____					_____	_____
3.	Tiotepa _____ mg i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 2 tim.			2 tim.		_____	_____
4.	Nästa infusion startar 12 timmar efter föregående start					_____	_____
5.	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml <i>Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet</i>					_____	_____
6.	Tablett/Injektion Antiemetika _____ _____					_____	_____
7.	Tiotepa _____ mg i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 2 tim. <i>((Startas 12 timmar efter föregående start av Tiotepa-infusion.))</i>			2 tim.		_____	_____

DAG 8 Datum_____ Beställs till kl_____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. Infusion av stamceller _____ ml

Ges intravenöst
