

**Datum:** \_\_\_\_\_  
**Läkare:** \_\_\_\_\_  
**Kur nr:** \_\_\_\_\_  
**Längd (cm):** \_\_\_\_\_ **Vikt (kg):** \_\_\_\_\_  
**Yta (m<sup>2</sup>):** \_\_\_\_\_ **Aktuellt GFR:** \_\_\_\_\_

Patientdata (namn och personnr)

Beställande enhet, sjukhus, tel. &amp; fax, kundnr

Antitumoral regim - Lymfom

RegimID: NRB-1329

**Karmustin-Tiotepa (BCNU-Tiotepa)**

Diagnoskod: C83.3

Ordination/Administrering

Dag	1	2	3	4	5	6	7	8
Karmustin Intravenös infusion 400 mg/m <sup>2</sup> (kroppsyta)	x1							
Tiotepa Intravenös infusion 5 mg/kg (kroppsvikt)		x2	x2					
Infusion av stamceller Intravenös infusion ml (standarddos)								x1

Högemetogen.

Antiemetika enligt lokal instruktion. \_\_\_\_\_

**Anvisningar för ordination**

Högemetogent dag 1, medelemetogent dag 2-3.

**DAG 1** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |                                                                                                    |  |  |  |  |        |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|-------|-------|
| 1. 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml<br><i>Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet</i> |  |  |  |  |        | _____ | ..... |
| 2. Tablett/Injektion Antiemetika<br>_____<br>_____                                                 |  |  |  |  |        | _____ | ..... |
| 3. <b>Karmustin</b> _____ <b>mg</b><br>i 500 ml Glukos 50 mg/ml<br>Ges intravenöst under 2 tim.    |  |  |  |  | 2 tim. | _____ | _____ |

**DAG 2** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |                                                                                                                                                                          |        |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|
| 1. 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml<br><i>Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet</i>                                                                       |        | _____ | ..... |
| 2. Tablett/Injektion Antiemetika<br>_____<br>_____                                                                                                                       |        | _____ | ..... |
| 3. <b>Tiotepa</b> _____ mg<br>i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml<br>Ges intravenöst under 2 tim.                                                                             | 2 tim. | _____ | _____ |
| 4. 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml<br><i>Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet</i>                                                                       |        | _____ | ..... |
| 5. Tablett/Injektion Antiemetika<br>_____<br>_____                                                                                                                       |        | _____ | ..... |
| 6. <b>Tiotepa</b> _____ mg<br>i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml<br>Ges intravenöst under 2 tim.<br><i>((Startas 12 timmar efter föregående start av Tiotepa-infusion.))</i> | 2 tim. | _____ | _____ |

**DAG 3** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |                                                                                                                                                                          |        |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|
| 1. 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml<br><i>Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet</i>                                                                       |        | _____ | ..... |
| 2. Tablett/Injektion Antiemetika<br>_____<br>_____                                                                                                                       |        | _____ | ..... |
| 3. <b>Tiotepa</b> _____ mg<br>i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml<br>Ges intravenöst under 2 tim.                                                                             | 2 tim. | _____ | _____ |
| 4. Nästa infusion startar 12 timmar efter föregående start                                                                                                               |        | ..... |       |
| 5. 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml<br><i>Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet</i>                                                                       |        | _____ | ..... |
| 6. Tablett/Injektion Antiemetika<br>_____<br>_____                                                                                                                       |        | _____ | ..... |
| 7. <b>Tiotepa</b> _____ mg<br>i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml<br>Ges intravenöst under 2 tim.<br><i>((Startas 12 timmar efter föregående start av Tiotepa-infusion.))</i> | 2 tim. | _____ | _____ |

**DAG 8** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Infusion av stamceller \_\_\_\_\_ ml**  
Ges intravenöst