

Wollner Underhållsbehandling

for Lymphoma

الجدول الزمني للعلاج (يُقرأ الجدول من اليسار إلى اليمين)

| يوم | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| Tioguanin | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cyklofosamidmono- hydrat | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hydroxikarbamid Morgondos | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | |
| Hydroxikarbamid Kvällsdos | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | |
| Daunorubicin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | |
| Metotrexat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Karmustin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cytarabin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vinkristin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metotrexat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| يوم | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
|------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| Tioguanin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cyklofosamidmono- hydrat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hydroxikarbamid Morgondos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hydroxikarbamid Kvällsdos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Daunorubicin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metotrexat | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | |
| Karmustin | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | |
| Cytarabin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vinkristin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metotrexat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| يوم | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | |
|------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| Tioguanin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cyklofosfamidmono- hydrat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hydroxikarbamid Morgondos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hydroxikarbamid Kvällsdos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Daunorubicin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metotrexat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Karmustin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cytarabin | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vinkristin | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metotrexat | | | | | | | | | | | | | | | X | | | X | | | | |

71 قديج ءة عرج موي

| يوم | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
|------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| Tioguanin | | | | | | | |
| Cyklofosfamidmono- hydrat | | | | | | | |
| Hydroxikarbamid Morgondos | | | | | | | |
| Hydroxikarbamid Kvällsdos | | | | | | | |
| Daunorubicin | | | | | | | |
| Metotrexat | | | | | | | |
| Karmustin | | | | | | | |
| Cytarabin | | | | | | | |
| Vinkristin | | | | | | | |
| Metotrexat | | | | | | | |

فيما يتعلق بعلاجك

تيجوانين Tioguanin وسيكلوفوسفاميد cyklofosfamid وهيدروكسي كارباميد hydroxikarbamid وداونوروبيسين وميتوتريكسات metotrexat وكارموستين karmustin وسيتارابين cytarabin وفينكريستين vinkristin هي أدوية مثبطة لنمو الخلايا السرطانية.

يتم تناول تيجوانين وميتوتريكسات، وهيدروكسي كارباميد على شكل أقراص أو كبسولات، بينما يتم تناول الأدوية الأخرى على شكل حقن ورؤية. يتم إعطاء ميتوتريكسات أيضا عن طريق حقن في قناة النخاع الشوكي.

تؤخذ الأدوية وفقاً للجدول الزمني المذكور أعلاه.

يجب أن تشرب الكثير من السوائل أثناء فترة العلاج لتقليل خطر الإصابة بعدوى التهابية في الجهاز البولي. خلال فترة المعالجة تتم متابعة فحوصات الدم ومراقبة أي آثار جانبية محتملة.

كيف تتناول الدواء

ميتوتريكسيت: Metotrexat ابتلع الأقراص كاملة بالماء. لا تتناول الأقراص بعد الأكل. انتظر ساعتين على الأقل بعد الوجبة، ولا تأكل أي شيء لمدة ساعة على الأقل بعد تناول الأقراص.

تيوجوانين قَنِن (لانفيس) (شِنِس): ابتلع الأقراص كاملة بالماء بعد الأكل أو على معدة فارغة.

هيدروكسي كارباميد **Hydroxikarbamid** (هيدروكسي يوريا) (سيدر): ابتلع الكبسولات كاملة بالماء بعد الأكل أو على معدة فارغة.

اقرأ المزيد في النشرة داخل العبوة.

آثار جانبية – الأعراض ونصائح

الآثار الجانبية التي ندرجها هنا هي الأكثر شيوعاً وأهمية. ويمكن أن تختلف اختلافاً كبيراً من شخص لآخر، وحتى من وقت لآخر. وقد تحدث الآثار الجانبية جرعتك أو تستدعي التوقف عن تناول الدواء.

استشر طبيبك أو ممرضتك إذا عانيت من أي آثار جانبية، ففي كثير من الأحيان يمكن تجنب هذه الأعراض أو التخفيف من حدتها.

التعب

من الشائع الإحساس بالإرهاق والتعب وانخفاض معدلات الطاقة والشعور بعدم الراحة الجسدية، واضطرابات في الذاكرة، وقد تجد صعوبة في التركيز وحل المشكلات. وقد يجعلك هذا العلاج تشعر بالإحباط والتوتر والقلق، وربما تجد أيضاً صعوبة في الاختلاط بالآخرين. وربما يستمر التعب والإرهاق لفترة طويلة بعد العلاج. نصائح: حاول ممارسة التمارين الرياضية والتحرك لأنهما العاملان الوحيدان المعروفان للمساعدة في التخلص من التعب والإرهاق.

الغثيان وتغير حاسة التذوق

قد تشعر بتوعك نتيجة العلاج. ولذلك سوف تُعطى دواءً مضاداً للغثيان بالتزامن مع العلاج، وقد تؤدي الأدوية للإصابة بالإمساك. ويمكنك الحصول على أنواع مختلفة من العلاجات وفقاً لما تشعر به. وقد تعاني من اضطراب في حاسة التذوق للطعام والشراب أثناء فترة العلاج.

نصائح: في بعض الأحيان يكون من الأفضل تناول وجبات خفيفة وحصص صغيرة من الطعام. فعلى سبيل المثال، عليك محاولة تناول اللبن المخثر فيل ميولك واللبن الزبادي وعجة البيض والسندويشات والشوربات الساخنة أو الباردة. كما إن شرب كميات أكثر من الماء بين الوجبات قد يقلل من حدة الغثيان.

مشاكل في المعدة والأمعاء

من الشائع الإصابة بالإسهال، وقد تعاني كذلك من الإمساك.

نصائح: تناول كمية من الماء أكثر من المعتاد يومياً. وإذا كنت تعاني من الإسهال، فتجنب الأطعمة الدهنية والحادة والغنية بالألياف. وإذا كنت مصاباً بالإمساك، فحاول تناول الأطعمة الغنية بالألياف وممارسة التمارين الرياضية. استشر طبيبك إذا أصبت بالإسهال أو الإمساك - فربما تحتاج إلى علاج.

القابلية للعدوى الالتهابية

ستكون عرضة للإصابة بالعدوى بعد فترة العلاج بسبب انخفاض عدد كريات الدم البيضاء. قبل كل علاج، تؤخذ عينة من الدم لمعرفة ما إذا كانت خلايا الدم قد تعافت. وإذا كانت القيم منخفضة جداً، يجب تأجيل العلاج.

نصائح: حاول على سبيل المثال تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص المصابين بالزكام أو أمراض المعدة، واغسل يديك كثيراً بالماء والصابون. وربما يكون الكحول معقم اليدين مفيداً في مثل هذه الحالات.

مشكلات في الفم والأغشية المخاطية

قد تتأثر الأغشية المخاطية لأنفك وفمك وعينيك وبطنك أثناء العلاج. وعلى سبيل المثال، قد تُصاب بنزيف وسيلان في الأنف. وقد تعاني من جفاف الفم واحمراره وحرقان وظهور تقرحات. وسوف تُصاب كذلك بالفطريات التي تحول بطانة فمك إلى اللون الأحمر أو إلى اللون الأبيض. وربما تُصاب عينيك بالجفاف وتصبح دامعة. ويمكن أيضاً أن تُصاب الأغشية المخاطية أسفل البطن بالجفاف.

نصائح: إذا كنت تعاني من جفاف الفم، فاستخدم المنشطات اللعابية المتوفرة في الصيدليات. اغسل فمك بمياه فيشي الحرارية الغنية بالمعادن لتجنب الإصابة بالفطريات. وكن منتبهاً لنظافة فمك، واستخدم فرشاة أسنان ناعمة ومعجون أسنان خفيف. وكن حذراً عند استخدام الخيط والعديد من المنتجات الخاصة بتنظيف الأسنان. أخبر طبيبك أسنانك عن علاجك ضد السرطان عند زيارتك له. وتجنب ارتداء العدسات اللاصقة إذا كنت تعاني من مشاكل في العين. يمكن للنساء استخدام كريم الإستروجين أو كريم مرطب أو زيوت لعلاج الأغشية المخاطية الجافة في أسفل البطن..

تساقط الشعر

رة أخرى. عادة ما يتساقط شعرك كلياً بعد (2-4) أسابيع من العلاج الأول. وسيبدأ بالنمو مرة أخرى بعد حوالي (3-4) أسابيع بعد آخر علاج كيميائي. وفي بعض الأحيان يتغير لون الشعر، وربما يصبح الشعر الأملس أجعداً، ولكن بمرور الوقت، يعود الشعر عادة إلى حالته السابقة. وفي بعض الأحيان، قد تفقد شعر حاجبيك ورموشك، ولكنها ستنمو أيضاً مرة أخرى.

الخدر والتنميل - اضطرابات حسية

قد تشعر بخدران ووخز في قد تشعر بخدران ووخز في يديك وقدميك، وقد تضعف مهاراتك الحركية الدقيقة. على سبيل المثال، قد تجد صعوبة في الضغط على الأزرار أو عند المشي. وعادة ما تختفي هذه الأعراض، ولكن ليس كلياً عند الجميع. أخبر طبيبك أو ممرضتك إذا تعرضت لخدران أو وخز في يديك وقدميك.

مشكلات في القلب

هذا الدواء يزيد من خطر الإصابة بقصور وفشل عمل القلب، وقد تعاني من ضيق في التنفس وخفقان القلب وتورم الكاحلين أو الساقين.

السعال وضيق النفس

قد تعاني من السعال وضيق قد تعاني من السعال وضيق النفس. أخبر طبيبك أو ممرضتك إذا كنت تعاني من صعوبة في التنفس.

مشكلات في العينين

قد تصاب عيونك بالاحمرار مع وخز وألم. وقد تعاني أيضاً من عدم وضوح الرؤية وجفاف العين وتصبح أكثر حساسية للضوء.

نصيحة: إذا شعرت بوخز في عينيك وأصابها الجفاف، استخدم قطرات مرطبة للعين متوفرة في الصيدليات

تواصل مباشرة مع العيادة في حالة:

في حالة الطوارئ:

• اتصل بالرقم 112 في حالة استمرار ألم حاد في الصدر أو شعور بالضغط على الصدر أو صعوبة التنفس/ضيق التنفس.

اتصل بالعيادة الخاص بك على الفور في حال:

- حمى (درجة حرارة أعلى من 38 درجة) أو عند درجة حرارة أقل من 36 درجة
- التدهور الصحي المفاجئ بغض النظر عن الأعراض
- في حالة ظهور أعراض التهاب في المسالك البولية أو أعراض الزكام قبل أن تتلقى العلاج
- غثيان شديد أو حرقان في الفم مما يصعب عليك تناول الطعام والشراب
- الإسهال الشديد الذي لا يقل مع التوقف عن تناول الأدوية
- نزيف في الأنف أو نزيف آخر لا يمكنك إيقافه أو ظهور كدمات على أجزاء كبيرة من الجسم

نصائح عامة

عادة ما تبقى آثار أدوية السرطان في البول لمدة تصل إلى (7) أيام بعد فترة العلاج. لذلك يجب الجلوس عند التبول لتجنب تناثر البول. وعند الانتهاء يجب إغلاق غطاء المرحاض وسكب الماء مرتين. ويوصى بتجنب الحمل أو التسبب في أن تحمل امرأة أثناء علاجك بأدوية السرطان، لأن هذه الأدوية قد تؤثر على الجنين. ولذلك، يوصى باستخدام وسائل آمنة لمنع الحمل. في بعض الأحيان تكون هناك حاجة إلى حماية مزدوجة، لأن الآثار الجانبية مثل الإسهال أو التأثير المباشر لأدوية السرطان قد تعني أن حبوب منع الحمل لا توفر حماية كافية بمفردها. وإذا كنت رجلاً، استخدم الواقي الذكري أثناء الجماع بعد (72) ساعة من العلاج، حيث يتم إفراز الأدوية المثبطة للخلايا أيضاً عن طريق السائل المنوي.

معلومات عامة عن مرض السرطان

لمزيد من المعلومات حول مرض السرطان يرجى زيارة الموقع: Vårdguiden and Cancerfonden 1177

www.1177.se

www.cancerfonden.se

ملاحظات
