

Datum: _____

Patientdata (namn och personnr)

Läkare: _____

Kur nr: _____

Beställande enhet, sjukhus, tel. & fax, kundnr

Längd (cm): _____

Vikt (kg): _____

Yta (m²): _____

Aktuellt GFR: _____

Antitumoral regim - Malignt melanom

RegimID: NRB-11079

Tebentafusp startdoser, kur 1 (Vecka 1-3)

Ordination/Administrering

Dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Tebentafusp Intravenös infusion 20 µg (standarddos)	x1																				
Tebentafusp Intravenös infusion 30 µg (standarddos)								x1													
Tebentafusp Intravenös infusion 68 µg (standarddos)															x1						

Minimalemetogen.

Antiemetika enligt lokal instruktion. _____

Villkor och kontroller för administration

Ökad beredskap för anafylaktisk reaktion.

Risk för hypotoni som kan behöva vätskebehandling.

BT, puls temp och andningsfrekvens (NEWS2) vid start av infusion, följ under behandling samt innan hemgång.

Använd ett Infusionsaggregat med inbyggt icke-pyrogent lågproteinbindande 0,2- mikrometersfilter.

Infusionshastighet mellan 15-20 minuter.

Anvisningar för ordination

Varje gång provtas:

Blodstatus: Hb, LPK, neutrofila, TPK

Elektrolytstatus: Na, K, Ca, kreatinin, magnesium, fosfat

Leverstatus: albumin, ALP, ALAT, bilirubin, LD, lipas

Amylas, CRP, glukos och gamma-GT

De första tre doserna ska administreras i sjukhusmiljö med övervakning av tecken och symtom på CRS (Cytokinfrisättningsyndrom = feber, hypoxi och hypotension) över natten i minst 16 timmar.

Risk för hypotoni: OM patienter får hypotoni av grad 3 eller 4 under någon av de tre första infusionerna starta vätskebehandling.

Premedicinering

Vid eventuell infusionsreaktion kan premedicinering med Paracetamol och Desloratadin ges.

Om ihållande eller återkommande CRS grad 2 vid föregående behandling ska även premedicinering med Dexametason 4 mg ges 30 min före behandlingsstart.

För att minimera risken för hypotoni vid eventuellt cytokinfrisättningsyndrom (CRS) ska intravenös vätskebehandling, baserad på klinisk utvärdering och patientens volymstatus, administreras innan infusionen påbörjas.

För patienter med binjureinsufficiens som står på underhållsbehandling med systemiska kortikosteroider ska justering av kortikosteroiddosen övervägas för att minska risken för hypotoni.

Dosjustering rekommendation

Dosreduceras ej. Uppehåll eller behandlingsavslut görs vid svårare toxicitet, och då ska också behandling med steroider övervägas, se FASS.

Antiemetika

Ingen rutinmässig behandling

DAG 1 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1.	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml <i>Intravenös infusion - prehydrering (Prehydrering kan ges på 2-3 timmar och kan även göras med annan vätska tex Ringer-Acetat.)</i>	3 tim.	_____	_____
2.	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml <i>Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet</i>		_____	_____
3.	Tablett/Injektion Antiemetika <i>(Ej rutinmässigt p.g.a. minimal emetogen effekt av ingående läkemedel.)</i> _____ _____		_____	_____
4.	NEWS2 kontroll före behandlingsstart		_____	_____
5.	Tebentafusp _____ µg i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 20 min. <i>(Observera att natriumkloridpåsen ska vara preparerad med humant albumin (se basfakta för dosering) före tillsats av Tebentafusp.)</i>	20 min.	_____	_____
6.	NEWS2 kontroll efter behandling		_____	_____
7.	NEWS2 kontroll 30 min efter behandling		_____	_____
8.	NEWS2 kontroll 60 min efter behandling		_____	_____
9.	NEWS2 kontroll 2 timmar efter behandling		_____	_____
10.	NEWS2 kontroll 4 timmar efter behandling		_____	_____
11.	NEWS2 kontroll 8 timmar efter behandling		_____	_____
12.	NEWS2 kontroll 12 timmar efter behandling		_____	_____
13.	NEWS2 kontroll 16 timmar efter behandling		_____	_____

DAG 8 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1.	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml <i>Intravenös infusion - prehydrering (Prehydrering kan ges på 2-3 timmar och kan även göras med annan vätska tex Ringer-Acetat.)</i>	3 tim.	_____
2.	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml <i>Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet</i>		_____
3.	Tablett/Injektion Antiemetika <i>(Ej rutinmässigt p.g.a. minimal emetogen effekt av ingående läkemedel.)</i> _____ _____		_____
4.	NEWS2 kontroll före behandlingsstart		_____
5.	Tebentafusp _____ µg i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 20 min. <i>(Observera att natriumkloridpåsen ska vara preparerad med humant albumin (se basfakta för dosering) före tillsats av Tebentafusp.)</i>	20 min.	_____	_____
6.	NEWS2 kontroll efter behandling		_____
7.	NEWS2 kontroll 30 min efter behandling		_____
8.	NEWS2 kontroll 60 min efter behandling		_____
9.	NEWS2 kontroll 2 timmar efter behandling		_____
10.	NEWS2 kontroll 4 timmar efter behandling		_____
11.	NEWS2 kontroll 8 timmar efter behandling		_____
12.	NEWS2 kontroll 12 timmar efter behandling		_____
13.	NEWS2 kontroll 16 timmar efter behandling		_____

DAG 15 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1.	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml <i>Intravenös infusion - prehydrering (Prehydrering kan ges på 2-3 timmar och kan även göras med annan vätska tex Ringer-Acetat.)</i>	3 tim.	_____	_____	_____
2.	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml <i>Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet</i>		_____	_____	_____
3.	Tablett/Injektion Antiemetika <i>(Ej rutinmässigt p.g.a. minimal emetogen effekt av ingående läkemedel.)</i> _____ _____		_____	_____	_____
4.	NEWS2 kontroll före behandlingsstart		_____	_____	_____
5.	Tebentafusp _____ µg i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 20 min. <i>(Observera att natriumkloridpåsen ska vara preparerad med humant albumin (se basfakta för dosering) före tillsats av Tebentafusp.)</i>	20 min.	_____	_____	_____
6.	NEWS2 kontroll efter behandling		_____	_____	_____
7.	NEWS2 kontroll 30 min efter behandling		_____	_____	_____
8.	NEWS2 kontroll 60 min efter behandling		_____	_____	_____
9.	NEWS2 kontroll 2 timmar efter behandling		_____	_____	_____
10.	NEWS2 kontroll 4 timmar efter behandling		_____	_____	_____
11.	NEWS2 kontroll 8 timmar efter behandling		_____	_____	_____
12.	NEWS2 kontroll 12 timmar efter behandling		_____	_____	_____
13.	NEWS2 kontroll 16 timmar efter behandling		_____	_____	_____