

Datum: \_\_\_\_\_

Patientdata (namn och personnr)

Läkare: \_\_\_\_\_

Kur nr: \_\_\_\_\_

Beställande enhet, sjukhus, tel. &amp; fax, kundnr

Längd (cm): \_\_\_\_\_

Vikt (kg): \_\_\_\_\_

Yta (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_

Aktuellt GFR: \_\_\_\_\_

Antitumoral regim - Matstrups- och  
magsäckscancer

Behandlingsavsikt: Palliativ

RegimID: NRB-683

**Docetaxel-FLV** (Docetaxel-Fluorouracil-Kalciumfolinat)

Kurintervall: 14 dagar

Ordnation/Administrering

Dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Ny kur dag 15
Docetaxel (vattenfri) Intravenös infusion 45 mg/m <sup>2</sup> (kroppsyta)	x1														
Fluorouracil Intravenös injektion 500 mg/m <sup>2</sup> (kroppsyta)	x1	x1													
Kalciumfolinat (vattenfritt) Intravenös injektion 60 mg/m <sup>2</sup> (kroppsyta)	x1	x1													

Medelemetogen.

Antiemetika enligt lokal instruktion. \_\_\_\_\_

**Villkor och kontroller för administration**

Ökad beredskap för anafylaktisk reaktion.

Kontrollera att patienten tagit sin premedicinering.

**Anvisningar för ordination**Blodstatus inkl. neutrofila. Behandlingen uppskjutes tills neutrofila  $\geq 1,5$  och TPK  $\geq 75$ .

Premedicinering dag 1 - 1 timme före Docetaxel tas Betapred 16 tabletter = 8 mg.

**Dosjustering rekommendation**

Vid genomgången neutropen feber eller oacceptabla biverkningar överväg dosreduktion till 75%.

**Antiemetika**

Förslag enligt stöddokument:

<https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/lakemedelsregimer/antiemetika/forebyggande-mot-illamaende-steg-2a-2dgr/>  
alternativt<https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/lakemedelsregimer/antiemetika/forebyggande-mot-illamaende-steg-2b-2d/>

Obs! Undvik dubbel dos kortison. Om flera kortisondoser ingår (som premedicinering, antiemetikaregim eller ingående i regimen på annat sätt) välj den högsta av de olika doserna.

**DAG 1** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml <i>Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet (Kontrollera att patienten tagit sin premedicinering med Betapred tabletter)</i>			_____	.....
2. Tablett/Injektion Antiemetika _____ _____			_____	.....
3. <b>Docetaxel (vattenfri)</b> _____ mg i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 30 min.		30 min.	_____	_____
4. <b>Fluorouracil</b> _____ mg Ges intravenöst under 3 min. <i>(Paus ca 30 minuter innan Kalciumfolinat ges)</i>		3 min.	_____	_____
5. <b>Kalciumfolinat (vattenfritt)</b> _____ mg Ges intravenöst under 3 min.		3 min.	_____	_____

**DAG 2** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml <i>Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet (T Betapred 0,5 mg 8 st på morgonen.)</i>			_____	.....
2. Tablett/Injektion Antiemetika _____ _____			_____	.....
3. <b>Fluorouracil</b> _____ mg Ges intravenöst under 3 min. <i>(Paus ca 30 minuter innan Kalciumfolinat ges)</i>		3 min.	_____	_____
4. <b>Kalciumfolinat (vattenfritt)</b> _____ mg Ges intravenöst under 3 min.		3 min.	_____	_____