Datum: _____

Läkare: _____

Kur nr: _____

Längd (cm): _____ **Vikt (kg):** _____

Yta (m^2): _____ **Aktuellt GFR:** _____

Patientdata (namn och personnr)

Beställande enhet, sjukhus, tel. & fax, kundnr

Antitumoral regim - Neuroendokrina tumörer

RegimID: NRB-7784

Streptozocin - Doxorubicin (underhållsdos)

Diagnoskod: C25.4, C74.0

Kurintervall: 21 dagar

Ordination/Administrering

Dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Ny kur dag 22
Doxorubicin Intravenös infusion 40 mg/m^2 (kroppsyta)	x1																					
Streptozocin Intravenös infusion 2000 mg (standarddos)	x1																					

Högemetogen.
Antiemetika enligt lokal instruktion. _____

Villkor och kontroller för administration Kontroll av blodstatus, Kreatinin, clearance (Cystatin C, Iohexol, kreatininclearence eller motsvarande).

Leverstatus inklusive bilirubin.

Doxorubicin - Starkt vävnadsretande. Central infart rekommenderas.

Anvisningar för ordination

Hb $\geq$ 100, Neutrofila $\geq$1,0, TPK $\geq$ 100, GFR $\geq$ 60

Om GFR $<$ 60 ml/min ge underhållsdos med Streptozocin delad på två dagar.

Dosjustering rekommendation

Hematologisk toxicitet

Neutrofila 1,0-1,5 - ge 80% av dos

Neutrofila $<$1,0 och/eller TPK $<$100 - behandlingen skjuts upp en vecka

Njurtoxicitet

GFR $\geq$60 ge 100 % dos.

GFR 50-59 använd regim för underhållsdos med Streptozocin fördelad på 2 dagar.

GFR $<$ 50 - behandlingen skjuts upp tills GFR $\geq$50 och använd då regim för underhållsdos Streptozocin fördelad på 2 dagar

DAG 1 Datum_____ Beställs till kl____ Avvakta ja nej	**Inf. tid**	**Klockan**	**Ssk. sign**	**Läk. sign**
1. 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml *Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet*		_____	_____	.....
2. 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml *Intravenös infusion - hydrering*	3 tim.	_____	_____	.....
3. Tablett/Injektion Antiemetika _____ _____		_____	_____	.....
4. Doxorubicin _____ mg i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 5 min. *(Start 90 min efter hydreringsstart, hydrering fortsätter parallellt utan paus.)*	5 min.	_____	_____	_____
5. Streptozocin _____ mg i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 30 min. *(Start 95 min efter hydreringsstart, hydrering fortsätter parallellt utan paus.)*	30 min.	_____	_____	_____