Datum: _____

Läkare: _____

Kur nr: _____

Längd (cm): _____ **Vikt (kg):** _____

Yta (m^2): _____ **Aktuellt GFR:** _____

Patientdata (namn och personnr)

Beställande enhet, sjukhus, tel. & fax, kundnr

Antitumoral regim - Neuroendokrina tumörer

RegimID: NRB-1426

Streptozocin - Fluorouracil (laddningsdos)

Diagnoskod: C25.4, C74.0

Kurintervall: 21 dagar

Ordination/Administrering

Dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Ny kur dag 22
Fluorouracil Intravenös injektion 400 mg/m^2 (kroppsyta)	x1	x1	x1																			
Streptozocin Intravenös infusion 1000 mg (standarddos)	x1	x1	x1	x1	x1																	

Högemetogen.
Antiemetika enligt lokal instruktion. _____

Villkor och kontroller för administration Kontroll av Blodstatus inklusive neutrofila, Kreatinin, clearance (Cystatin C, Iohexol, kreatininclearence eller motsvarande).

Kontroll av mucosit och diarré.

Anvisningar för ordination

Hb $\geq$ 100, Neutrofila $\geq$1,0, TPK $\geq$ 100, GFR $\geq$ 50

Dosjustering rekommendation

Hematologisk toxicitet

Neutrofila 1,0-1,5 – ge 80% av doser båda preparat.

Neutrofila <1,0 och/eller TPK <100 – behandlingen skjuts upp en vecka.

Njurtoxicitet

GFR $\geq$ 60 ge 100 % laddningsdos.

GFR 50-59 ge 80% laddningsdos och välj senare regim för underhållsdos Streptozocin fördelad på 2 dagar.

GFR < 50 - avvakta tills GFR >50 innan laddningsdos ges, välj senare regim för underhållsdos Streptozocin fördelad på 2 dagar.

Mucosit och diarré

Fluorouracildos

vid grad 2 - ge 80 % av dos.

vid grad 3-4 – skjut på behandling tills grad 0-1. Överväg DPD brist och behov av avbrytande av eller byte av behandling.

DAG 1 Datum_____ Beställs till kl____ Avvakta ja nej	**Inf. tid**	**Klockan**	**Ssk. sign**	**Läk. sign**
1. 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml *Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet*		_____	_____	.....
2. 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml *Intravenös infusion - hydrering*	90 min.	_____	_____	.....
3. Tablett/Injektion Antiemetika _____ _____		_____	_____	.....
4. **Fluorouracil _____ mg** Ges intravenöst under 5 min. *(Start 60 min efter hydreringsstart, hydrering fortsätter parallellt utan paus.)*	5 min.	_____	_____	_____
5. **Streptozocin _____ mg** i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 10 min. *(Start direkt efter Fluorouracil, ca 65 min efter hydreringsstart, hydrering fortsätter parallellt utan paus.)*	10 min.	_____	_____	_____

DAG 2 Datum_____ Beställs till kl____ Avvakta ja nej	**Inf. tid**	**Klockan**	**Ssk. sign**	**Läk. sign**
1. 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml *Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet*		_____	_____	.....
2. 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml *Intravenös infusion - hydrering*	90 min.	_____	_____	.....
3. Tablett/Injektion Antiemetika _____ _____		_____	_____	.....
4. **Fluorouracil _____ mg** Ges intravenöst under 5 min. *(Start 60 min efter hydreringsstart, hydrering fortsätter parallellt utan paus.)*	5 min.	_____	_____	_____
5. **Streptozocin _____ mg** i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 10 min. *(Start direkt efter Fluorouracil, ca 65 min efter hydreringsstart, hydrering fortsätter parallellt utan paus.)*	10 min.	_____	_____	_____

DAG 3 Datum_____ Beställs till kl____ Avvakta ja nej	**Inf. tid**	**Klockan**	**Ssk. sign**	**Läk. sign**
1. 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml *Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet*		_____	_____	.....
2. 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml *Intravenös infusion - hydrering*	90 min.	_____	_____	.....
3. Tablett/Injektion Antiemetika _____ _____		_____	_____	.....
4. **Fluorouracil _____ mg** Ges intravenöst under 5 min. *(Start 60 min efter hydreringsstart, hydrering fortsätter parallellt utan paus.)*	5 min.	_____	_____	_____
5. **Streptozocin _____ mg** i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 10 min. *(Start direkt efter Fluorouracil, ca 65 min efter hydreringsstart, hydrering fortsätter parallellt utan paus.)*	10 min.	_____	_____	_____

DAG 4 Datum_____ Beställs till kl____ Avvakta ja nej	**Inf. tid**	**Klockan**	**Ssk. sign**	**Läk. sign**
1. 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml *Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet*		_____	_____	.....
2. 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml *Intravenös infusion - hydrering*	90 min.	_____	_____	.....
3. Tablett/Injektion Antiemetika _____ _____		_____	_____	.....
4. **Streptozocin _____ mg** i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 10 min. *(Start 60 min efter hydreringsstart, hydrering fortsätter parallellt utan paus.)*	10 min.	_____	_____	_____

DAG 5 Datum_____ Beställs till kl____ Avvakta ja nej	**Inf. tid**	**Klockan**	**Ssk. sign**	**Läk. sign**
1. 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml *Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet*		_____	_____	.....
2. 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml *Intravenös infusion - hydrering*	90 min.	_____	_____	.....
3. Tablett/Injektion Antiemetika _____ _____		_____	_____	.....
4. Streptozocin _____ mg i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 10 min. *(Start 60 min efter hydreringsstart, hydrering fortsätter parallellt utan paus.)*	10 min.	_____	_____	_____