

## Antitumoral regim - Neuroendokrina tumörer

Behandlingsavsikt: Adjuvant, Palliativ

**Streptozocin (laddningsdos)**

C25.4, C74.0

Kurintervall: 21 dagar

## Översikt

## Läkemedel

Substans	Admin- istrering	Spädning	Infusion- stid	Grunddos/ admtillfälle	Beräkn- ingssätt	Maxdos/ admtillfälle	Max ack. dos
1. Streptozocin	Intravenös infusion	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml infusion	30 min.	1000 mg	standarddos		

## Regimbeskrivning

Dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Ny kur dag 22
1. Streptozocin	x1	x1	x1	x1	x1																	

Emetogenicitet: Hög

## Anvisningar för regimen

## Villkor för start av regimen

Blodstatus inklusive neutrofila, Kreatinin, clearance (Cystatin C, lohexol, kreatininclearance eller motsvarande).

## Villkor och kontroller för administration

Kontroll av Blodstatus inklusive neutrofila, Kreatinin, clearance (Cystatin C, lohexol, kreatininclearance eller motsvarande).

## Anvisningar för ordination

Hb  $\geq$  100, Neutrofila  $\geq$ 1,0, TPK  $\geq$  100 GFR  $\geq$  50

## Dosreduktion rekommendation

## Hematologisk toxicitet

Neutrofila 1,0-1,5 – ge 80% av dos

Neutrofila  $<$ 1,0 och/eller TPK  $<$ 100 – behandlingen skjuts upp en vecka

## Njurtoxicitet

GFR  $\geq$  60 ge 100% laddningsdos.

GFR 50-59 ge 80% laddningsdos och välj senare regim för underhållsdos Streptozocin fördelad på 2 dagar.

GFR  $<$  50 - avvakta tills GFR  $\geq$ 50 innan laddningsdos ges, välj senare regim för underhållsdos Streptozocin fördelad på 2 dagar.

## Övrig information

Observera – kortison tillåtet och skall ges i antiemetika scheman vid Streptozocinbehandling.

## Biverkningar

## Streptozocin

## Observandum

## Kontroll

## Stödande behandling

## Hög emetogenicitet

Antiemetika enligt lokala protokoll.

Antiemetika

## Njurtoxicitet

Toxicitet dosrelaterad och kumulativ, risk ökar om tidigare njursjukdom eller kombination med andra nefrotoxiska läkemedel. Mild proteinuri är ett tidigt tecken på njurtoxicitet.

## Gastrointestinal påverkan

Diarre vanligt.

Fortsättning på nästa sida

**Streptozocin (Fortsättning)****Observandum****Kontroll****Stödjande behandling**

---

**Endokrinologi**Hyper/hypoglykemi förekommer.

---

**Versionsförändringar****Version 2.1**

Patientinfo tillagd

**Version 2.0**

500ml 30min