

# Antitumoral regim - Neuroendokrina tumörer

## Streptozocin (underhållsdos, 2 dagar Streptozocin)

Behandlingsavsikt: Adjuvant, Palliativ

C25.4 C74.0

Kurintervall: 21 dagar

## Översikt

### Läkemedel

Substans	Admin- istrering	Spädning	Infusion- stid	Grunddos/ admtillfälle	Beräkn- ingssätt	Maxdos/ admtillfälle	Max ack. dos
1. Streptozocin	Intravenös infusion	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml infusion	30 min.	1000 mg	standarddos		

### Regimbeskrivning

Dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Ny kur dag 22
1. Streptozocin	x1	x1																				

Emetogenicitet: Hög

### Anvisningar för regimen

#### Villkor för start av regimen

Blodstatus inklusive neutrofila, Kreatinin, clearance (Cystatin C, lohexol, kreatininclearance eller motsvarande).

#### Villkor och kontroller för administration

Kontroll av Blodstatus inklusive neutrofila, Kreatinin, clearance (Cystatin C, lohexol, kreatininclearance eller motsvarande).

#### Anvisningar för ordination

Hb  $\geq$  100, Neutrofila  $\geq$  1,0, TPK  $\geq$  100, GFR  $\geq$  50

Denna underhållsdos Streptozocin delad på två dagar används om GFR &lt; 60 vid något tillfälle under Streptozocinbehandling.

#### Dosreduktion rekommendation

##### Hematologisk toxicitet

Neutrofila 1,0-1,5 – ge 80% av dos

Neutrofila &lt;1,0 och/eller TPK &lt;100 – behandlingen skjuts upp en vecka.

##### Njurtoxicitet

GFR  $\geq$  50 ge 100% av underhållsdos med Streptozocin fördelad på 2 dagar.GFR < 50 - behandlingen skjuts upp tills GFR  $\geq$ 50.

#### Övrig information

Denna underhållsdos Streptozocin delad på två dagar används om GFR &lt; 60 ml/min vid något tillfälle under Streptozocinbehandling.

Observera – kortison tillåtet och skall ges i antiemetika scheman vid Streptozocinbehandling.

### Biverkningar

#### Streptozocin

##### Observandum

##### Kontroll

##### Stödjande behandling

##### Hög emetogenicitet

Antiemetika enligt lokala protokoll.

Antiemetika

##### Njurtoxicitet

Toxicitet dosrelaterad och kumulativ, risk ökar om tidigare njursjukdom eller kombination med andra nefrotoxiska läkemedel. Mild proteinuri är ett tidigt tecken på njurtoxicitet.

Fortsättning på nästa sida

**Streptozocin (Fortsättning)****Observandum****Kontroll****Stödjande behandling****Gastrointestinal påverkan**

Diarre vanligt.

**Endokrinologi**

Hyper/hypoglykemi förekommer.

**Versionsförändringar****Version 2.1**

Patientinfo tillagd

**Version 2.0**

500ml 30min