

فيما يتعلق بعلاجك

يؤثر العلاج المثبت للخلايا الذي تتقاضاه على نخاع العظم وبالتالي على خلايا الدم البيضاء، التي تعد جزءاً من الدفاع ضد العدو. يوصف لك دواء لمساعدة نخاع العظام على التعافي. تكون الحقنة مملوقة مسبقاً ويجب إعطاؤها في الأنسجة الموجودة تحت الجلد (حقنة تحت الجلد) في البطن أو على السطح الخارجي للفخذين.

بالنسبة للكثيرين، يفضلون أخذ الحقنة في المساء.

يتم تخزين المحققن باردة ولكن توضع لفترة في درجة حرارة الغرفة قبل تناولها.

اقرأ على العبوة الوقت الذي ينطبق تحديداً على محققنك.

آثار جانبية - الأعراض ونصائح

الآثار الجانبية التي تدرجها هنا هي الأكثر شيوعاً وأهمية. ويمكن أن تختلف اختلافاً كبيراً من شخص لآخر، وحتى من وقت لآخر. وقد تحدد الآثار الجانبية جرعتك أو تستدعي التوقف عن تناول الدواء.

استشر طبيبك أو ممرضتك إذا عانيت من أي آثار جانبية، ففي كثير من الأحيان يمكن تجنب هذه الأعراض أو التخفيف من حدتها.

الم في العضلات والهيكل العظمي

من الشائع حدوث الم ووهن وضعف في العضلات.

نصيحة: يمكن استخدام مسكنات الم الشائعة للتخلص وتحفيظ حدة الم.

ملاحظات

يجب أن تأخذ محققن فيلجراستيم يوم

ملاحظات