

فيما يتعلق بعلاجك

يؤثر العلاج المثبت للخلايا السرطانية الذي تتلقاه على نخاع العظم وبالتالي على خلايا الدم البيضاء، التي تعد جزءاً من الدفاع ضد العدو. يوصى لك دواء لمساعدة نخاع العظام على التعافي. يجب عليك أخذ الحقنة بعد 24 ساعة على الأقل من العلاج الكيميائي. الحقنة مملوقة مسبقاً ويجب إعطاؤها في الأنسجة الموجودة تحت الجلد (تسمى بحقنة تحت الجلد) في البطن أو على السطح الخارجي للفخذين. بالنسبة للكثرين، يفضلون أخذ الحقنة في المساء.

يتم تخزين المحاقن باردة ولكن توضع لفترة في درجة حرارة الغرفة قبل تعاطيها. اقرأ على العبوة الوقت الذي ينطبق تحديداً على محاقنك.

آثار جانبية - الأعراض ونصائح

الآثار الجانبية التي تدرجها هنا هي الأكثر شيوعاً وأهمية. ويمكن أن تختلف اختلافاً كبيراً من شخص لآخر، وحتى من وقت لآخر. وقد تحدد الآثار الجانبية جرعتك أو تستدعي التوقف عن تناول الدواء. استشر طبيبك أو ممرضتك إذا عانيت من أي آثار جانبية، فهي كثيرة من الأحيان يمكن تجنب هذه الأعراض أو التخفيف من حدتها.

الم في العضلات والهيكل العظمي
من الشائع حدوث الم ووهن وضعف في العضلات.
نصيحة: يمكن استخدام مسكنات الألم الشائعة لتسكين وتخفيف حدة الألم.

ملاحظات