

Pegfilgrastim subcutant

فيما يتعلق بعلاجك

يؤثر العلاج المثبط للخلايا السرطانية الذي تتلقاه على نخاع العظم وبالتالي على خلايا الدم البيضاء، التي تعد جزءاً من الدفاع ضد العدوى. يوصف لك دواء لمساعدة نخاع العظام على التعافي. يجب عليك أخذ الحقنة بعد 24 ساعة على الأقل من العلاج الكيميائي. الحقنة مملوءة مسبقاً ويجب إعطاؤها في الأنسجة الموجودة تحت الجلد (تسمى بحقنة تحت الجلد) في البطن أو على السطح الخارجي للفخذين.

بالنسبة للكثيرين، يفضلون أخذ الحقنة في المساء.

يتم تخزين المحاقن باردة ولكن توضع لفترة في درجة حرارة الغرفة قبل تعاطيها.

اقرأ على العبوة الوقت الذي ينطبق تحديداً على محاقنك.

آثار جانبية - الأعراض ونصائح

الآثار الجانبية التي ندرجها هنا هي الأكثر شيوعاً وأهمية. ويمكن أن تختلف اختلافاً كبيراً من شخص لآخر، وحتى من وقت لآخر. وقد تحدد الآثار الجانبية جرعتك أو تستدعي التوقف عن تناول الدواء.

استشر طبيبك أو ممرضتك إذا عانيت من أي آثار جانبية، ففي كثير من الأحيان يمكن تجنب هذه الأعراض أو التخفيف من حدتها.

ألم في العضلات والهيكل العظمي

من الشائع حدوث ألم ووهن وضعف في العضلات.

نصيحة: يمكن استخدام مسكنات الألم الشائعة لتسكين وتخفيف حدة الألم.

ملاحظات

