

Apalutamid

vid Urologisk cancer

Schema för regimen

Dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Apalutamid Morgondos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Ny kur dag 29

Dag	22	23	24	25	26	27	28
Apalutamid Morgondos	X	X	X	X	X	X	X

Om din behandling

Apalutamid är ett antihormon, där testosteronets effekt (det manliga könshormonet) blockeras och cancercellerna hindras från att föröka sig.

Du tar tablettorna 1 gång om dagen utan uppehåll. Din läkare eller sjuksköterska informerar dig om du ska ändra något i din behandling. Under behandlingen följs dina blodprover och eventuella biverkningar. Fall och frakturer (brutna ben) är vanligt. Din läkare kommer ta reda på om du har en ökad risk för fallbenägenhet.

Så tar du läkemedlet

Svälj tablettorna hela med vatten. Ta tablettorna med eller utan mat vid samma tidpunkt varje dag. Om du missar en dos ta den förskrivna dosen så nära den vanliga tiden som möjligt. Vid missad dos under en hel dag, återuppta behandlingen nästa dag.

Läs mer i bipacksedeln.

Biverkningar - symtom och tips

Biverkningarna vi listar här är de vanligaste och viktigaste. De kan variera mycket mellan olika personer, och även från gång till gång. Biverkningarna är ofta kvar flera månader efter avslutad behandling. Biverkningarna kan avgöra din dos eller göra att det behövs ett uppehåll i behandlingen.

Berätta för din läkare eller sjuksköterska om du har biverkningar. Ofta kan besvären förebyggas eller lindras.

Vallningar

Värmevallning och svettning är vanligt.

Tips: Försök att motionera och röra på dig.

Minskad sexuell lust

Minskning av testosteronnivån kan leda till förlust av sexuell lust. Potensen kan försvinna, det vill säga man får svårt att få erektion, man blir impotent.

Besvär med klåda och utslag

Du kan få klåda och utslag.

Tips: När du tvättar huden, var varsam och använd mild tvål. Smörj med mjukgörande kräm.

Högt blodtryck

Högt blodtryck är en vanlig biverkan. Ditt blodtryck kontrolleras under behandlingen. Du kan behöva blodtrycks-sänkande läkemedel. Rapportera ändringar av blodtrycksläkemedel till din kontaktsjuksköterska eller läkare.

Besvär med mage och tarm

Diarré är vanligt. Du kan även bli förstoppad.

Tips: Drick mycket, några glas mer än vanligt per dag. Om du har diarré, undvik fet, starkt kryddad och fiberrik mat. Om du är förstoppad, prova fiberrik mat och motion. Prata med din sjuksköterska om du får diarré eller förstoppning - du kan behöva läkemedel.

Allmänna råd

Läkemedlet kan påverka foster. Om du är sexuellt aktiv, använd kondom och annan form av preventivmedel under behandlingen och en tid efter. Se i FASS eller läkemedlets bipacksedel vad som gäller just för ditt läkemedel.

Allmän information och råd om cancer

Bra information om cancer finns hos både [1177](#) och [Cancerfonden](#). För allmänna råd och stöd kontakta [Cancerrådgivningen](#)

Anteckningar
