

Antitumoral regim - Prostatacancer

RegimID: NRB-7818

Bikalutamid

Diagnoskod: C61

Kurintervall: 28 dagar

Översikt

Läkemedel

Substans	Admini- strering	Spädning	Infusions- tid	Grunddos/ admtillfälle	Beräk- ningsätt	Maxdos/ admtillfälle	Max ack. dos
1. Bikalutamid	Peroral tablett			150 mg	standarddos		

Regimbeskrivning

Dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1. Bikalutamid Peroral tablett 150 mg	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1

Dag	22	23	24	25	26	27	28	Ny kur dag 29
1. Bikalutamid Peroral tablett 150 mg	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	

Emetogenicitet: Minimal

Behandlingsöversikt

Kontinuerlig behandling.

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen

Kontroll av Hb, LPK, TPK, Na, K, Ca, kreatinin, ASAT, ALAT.

Bikalutamid är en potent enzyminducerare som kan ge effektminskning för många vanliga läkemedel, se FASS. En genomgång av läkemedel som kan ges samtidigt bör därför göras innan behandlingsstart.

Villkor och kontroller för administration

Glömd dos - ta inte dubbel dos (två doser på en gång) för att kompensera för en glömd dos.

Bikalutamid Peroral tablett

Dosering i förhållande till måltid: Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag

Anvisningar för ordination

Om baslinjeprover normala: Hb, LPK, TPK, ASAT, ALAT 4-6 veckor efter insättning.

Antiemetika

Ingen rutinmässig behandling

Biverkningar

Bikalutamid
Observandum

Hematologisk toxicitet

Anemi förekommer.

Kontroll

Blodvärden

Stödjande behandling

Fortsättning på nästa sida

Bikalutamid (Fortsättning)

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Endokrinologi Värmevallningar mycket vanliga. Gynekomasti och ömhet bröst vanligt, inte alltid reversibelt, framför allt ej efter långvarig behandling. Förebyggande bröstbestrålning erbjuds därför vid tänkt långvarig behandling. Erektile dysfunktion förekommer. Nedsatt glukostolerans har rapporterats vid kombination med LHRH agonister, kontroll av blodglukos bör då övervägas.		
Gastrointestinal påverkan Förstoppning vanligt. Illamående, diarré och buksmärta förekommer.		
Levertoxicitet Förhöjda levervärden förekommer, sällan allvarliga, oftast övergående. Leversvikt har rapporterats inklusive dödsfall. Följ levervärden regelbundet, de flesta förändringar inträffar inom de första 6 månaderna.	Blodvärden	
Hudtoxicitet Hudutslag förekommer, eventuellt vanligare vid högre dosering. Alopeci/håravfall, torr hud och klåda förekommer. Ljuskänslighetsreaktioner har rapporterats i sällsynta fall, undvik direkt exponering för solljus, solkräm kan övervägas.		
Andningsvägar Interstitiell lungsjukdom har rapporterats inklusive dödsfall. Utred vid misstanke på förvärrade eller nyttillkomna lungsymtom så som dyspné, hosta och feber.		
Njurtoxicitet Hematuri förekommer.		
Hjärttoxicitet Androgen deprivationsterapi kan förlänga QT-intervallet, varför försiktighet vid anamnes på förlängning av QT-intervall eller samtidig behandling med andra läkemedel som kan ge förlängning av QT-intervall. Hjärtinfarkt och hjärtsvikt omnämns, där risk ökar vid kombination med LHRH-agonist.		
Övrigt Minskad lust (libido) och depression förekommer. Yrsel och sömnhet förekommer. Asteni/trötthet förekommer. Ödem (svullnad) och viktuppgång förekommer.		
Interaktionsbenägen substans Vid samtidig administrering av warfarin med bikalutamid rekommenderas noggrann kontroll av INR då warfarinets effekt kan öka. (Bikalutamid kan tränga undan warfarin från dess proteinbindningställen.) Samtidig administrering av läkemedel som kan förlänga QT-intervall eller antiarytmika med bikalutamid bör ske med försiktighet, då bikalutamid i sig kan förlänga QT-intervall. Samtidig administrering av läkemedel med snävt terapeutiskt index och som är substrat för cytokrom P450 med bikalutamid bör ske med försiktighet då ökade koncentrationer av dessa läkemedel skulle kunna ske, se FASS. Kontraindikation för samtidig administrering av terfenadin, astemizol och cisaprid med bikalutamid föreligger, se FASS.		

Versionsförändringar

Version 1.5

antiemetika Ingen rutinmässig behandling

Version 1.4

Tagit bort regimschemat

Version 1.3

Diagnoskod rättad.

Version 1.2

lagt till patientinformationen

Version 1.1

lagt till patientinformationen

Version 1.0
Regimen fastställdes