

# Antitumoral regim - Prostatacancer

## Degarelix

Behandlingsavsikt: Palliativ

RegimID: NRB-9067

## Översikt

### Läkemedel

Substans	Admin-istrering	Spädning	Infusion- stid	Grunddos/ admtillfälle	Beräkn- ingssätt	Maxdos/ admtillfälle	Max ack. dos
1. Degarelix	Subkutan injektion			240 mg	standarddos		
2. Degarelix	Subkutan injektion			80 mg	standarddos		

### Regimbeskrivning

Dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1. Degarelix Subkutan injektion 240 mg	x1																				
2. Degarelix Subkutan injektion 80 mg																					

Dag	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1. Degarelix Subkutan injektion 240 mg																					
2. Degarelix Subkutan injektion 80 mg								x1													

Dag	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
1. Degarelix Subkutan injektion 240 mg															
2. Degarelix Subkutan injektion 80 mg															x1

**Emetogenicitet:** Minimal

#### Behandlingsöversikt

Startdos med 2X120 mg ges initialt och därefter ges 80 mg månadsvis kontinuerligt. Injicerade lösningen blir en läkemedelsdepå som kontinuerligt frisätter Degarelix.

### Anvisningar för regimen

#### Villkor för start av regimen

Blodtrycks kontroll.

Försiktighet vid diabetes pga risk för förändrad glukosintolerans.

EKG för patienter med QT-förlängning i anamnesen eller med riskfaktorer för QT-förlängning.

Risk för osteoporosrelaterade frakturer. Överväg bentäthetsmätning eller osteoporosbehandling enligt vårdprogram.

<https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/prostatacancer/vardprogram/omvardnad-rehabilitering-och-behandling-av-biverkningar/#chapter-15-13-Forebyggande-av-skelettkomplikationer>

### Villkor och kontroller för administration

Degarelix: Ges som en subkutan injektion i bukområdet. Injektionsstället bör varieras periodiskt. Injektionerna bör ges i områden där patienten inte exponeras för tryck, t ex inte i närheten av byxlinning eller bälte och inte nära revbenen.

Reaktioner från injektionsstället tex smärta och rodnad förekommer. Även influensaliknande symptom förekommer i anslutning till injektion.

### Anvisningar för ordination

Regelbunden uppföljning av patienter med anamnes på depression och hypertoni.

## Biverkningar

Degarelix Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
<b>Övrigt</b> Värmevallningar vanliga. Minskad libido (sexuell lust) och impotens vanligt. Testikelatrofi förekommer. Gynekomasti förekommer.		
<b>Övrigt</b> Sömnbesvär förekommer. Humörförändringar och depression finns rapporterat.		
<b>Hudtoxicitet</b> Reaktioner vid injektionsstället (rodnad, svullnad, smärta) vanligt. Ökad svettning förekommer. Rodnad, klåda, utslag har rapporterats. Alopeci (hårfall) har rapporterats.		
<b>CNS påverkan</b> Yrsel och huvudvärk förekommer.		
<b>Endokrinologi</b> Hyperglykemi och diabetes förekommer. Metabola förändringar som minskad glukostolerans, viktförändringar, förhöjda kolesterolnivåer kan ge ökad risk för kardiovaskulära händelser som angina, hjärtinfarkt, stroke.		
<b>Övrigt</b> Risk för minskad bentäthet, rapporter om osteoporos.		
<b>Hjärttoxicitet</b> Förlängd QT-tid finns beskrivet för androgen deprivationsterapi. Om anamnes på QT-förlängning eller om riskfaktorer för QT-förlängning finns, bör man överväga nytta/risk balansen före behandlingsstart.		

## Versionsförändringar

### Version 1.2

Patientinfo

### Version 1.1

Justerade administrationsschemat.

### Version 1.0

Regimen fastställdes