

Datum: \_\_\_\_\_

Patientdata (namn och personnr)

Läkare: \_\_\_\_\_

Kur nr: \_\_\_\_\_

Längd (cm): \_\_\_\_\_

Vikt (kg): \_\_\_\_\_

Yta (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_

Aktuellt GFR: \_\_\_\_\_

Beställande enhet, sjukhus, tel. &amp; fax, kundnr

Antitumoral regim - Prostatacancer

Behandlingsavskrift: Palliativ

RegimID: NRB-9069

**Karboplatin - Etoposid (iv dag 1, po dag 2-3)**

Kurintervall: 21 dagar

Ordination/Administrering

Dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Ny kur dag 22
Karboplatin Intravenös infusion 5 x (GFR+25) mg	x1																					
Etoposid Intravenös infusion 100 mg/m <sup>2</sup>	x1																					
Etoposid Peroral kapsel 100 mg/m <sup>2</sup>		x2	x2																			

Högemetogen.

Antiemetika enligt lokal instruktion. \_\_\_\_\_

**Villkor och kontroller för administration**

Kontroll av blodstatus, Kreatinin, clearance (Cystatin C, lohexol, kreatininclearance eller motsvarande)

**Anvisningar för ordination**

Hb ≥ 100, Neutrofila ≥ 1,0, TPK ≥ 100, GFR &gt;20

*Karboplatin:* Dosering av totaldos enligt Calverts formel: AUC x (GFR+25). Använd absolut värde = okorrigerat GFR (ml/min). För estimering av eGFR och konvertering från relativt värde = korrigeras GFR (ml/min/1.73m<sup>2</sup>) till okorrigerat GFR, använd kalkylator på <https://egfr.se/> För utförliga anvisningar se "basfakta om läkemedel" för Karboplatin.

*Etoposid peroralt* - Biotillgänglighet peroralt cirka 50 %. Dagliga doser över 200 mg bör delas upp så att de ges 2 gånger dagligen. Etoposidkapslar finns i styrkan 50 mg.

**Dosjustering rekommendation****Hematologisk toxicitet**

Neutrofila 1,5-1,0 ge 80% av doser båda preparat.

Neutrofila &lt;1,0 och/eller TPK &lt; 100 , skjut upp behandling en vecka.

**Lågt albumin**

Vid serum-albumin &lt;30 överväg 75-80 % dos Etoposid.

**DAG 1** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml  
*Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet*
2. Tablett/Injektion Antiemetika  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_
3. **Karboplatin** \_\_\_\_\_ **mg**  
 i 250 ml Glukos 50 mg/ml  
 Ges intravenöst under 30 min.
4. **Etoposid** \_\_\_\_\_ **mg**  
 i 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml  
 Ges intravenöst under 60 min.

**DAG 2** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. Tablett/Injektion Antiemetika  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_
2. **Etoposid** \_\_\_\_\_ **mg**  
 Ges peroralt Morgondos
3. **Etoposid** \_\_\_\_\_ **mg**  
 Ges peroralt Kvällsdos

**DAG 3** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. Tablett/Injektion Antiemetika  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_
2. **Etoposid** \_\_\_\_\_ **mg**  
 Ges peroralt Morgondos
3. **Etoposid** \_\_\_\_\_ **mg**  
 Ges peroralt Kvällsdos