Dexrazoxan

vid Övriga

Om din behandling

Du har fått en specialbehandling på grund av att det skett ett läckage av en cancerbehandling ut ur slang eller kärl till kroppsvävnad. Specialbehandlingen är till för att motverka skador av läckaget.

Du kommer att få specialbehandlingen som dropp vid ett tillfälle per dygn under tre dagar. Varje dropp tar cirka en timme.

Biverkningar som har beskrivits för specialbehandlingen är:

Smärta, svullnad och rodnad vid injektionsstället.

Yrsel och trötthet.

Muskelsmärtor.

Illamående, kräkningar och diarré.

Vissa biverkningar är sådant man inte känner i kroppen, men som kan följas med blodprover. Därför kommer det att tas blodprover på dig under behandlingen.

Det är viktigt att du berättar hur du mår till dem som tar hand om dig och denna specialbehandling. Dels behöver vården få information om alla sorters biverkningar som kan tänkas finnas och dels kan det finnas god lindring att få mot biverkningar.

Det är viktigt att inte bli gravid eller göra någon gravid när du behandlas med denna specialbehandling, eftersom läkemedlet kan påverka fostret. Använd därför säkra preventivmedel. Ibland behövs dubbelt skydd, biverkningar som diarré eller direkt påverkan av cancerläkemedel kan göra att P-piller inte räcker som ensamt skydd. Kvinnor med risk att bli gravid skall använda säkra preventivmedel i 6 månader efter behandlingen och män med kvinnlig partner med risk att bli gravid skall använda säkra preventivmedel i 3 månader efter behandlingen.

Kontakta genast din klinik vid:

Akut

Ring 112 vid ihållande akut bröstsmärta, tryck över bröstet eller svårt att andas/andnöd

Ring genast din klinik vid:

- Feber (temp över 38 grader) eller vid temp under 36 grader
- Plötslig försämring oavsett symtom
- Vid infektionssymtom från urinvägar eller förkylningssymtom innan du ska få behandling
- Svårt illamående eller sveda i munnen som gör att du har svårt att äta och dricka
- Kraftig diarré som inte minskar med stoppande läkemedel
- Näsblod eller annan blödning du inte får stopp på eller blåmärken över stora delar av kroppen