

Filgrastim subkutant

vid Övriga

Om din behandling

Den cytostatikabehandling som du får påverkar benmärgen och därmed de vita blodkropparna, som är en del av infektionsförsvaret. Du är ordinerad ett läkemedel som hjälper benmärgen att återhämta sig. Sprutan är förfylld och ska ges i vävnaden under huden (subkutant) i magen eller på lårens utsidor.

För många känns det bättre att ta injektionen på kvällen.

Sprutorna förvaras kallt men kan förvaras en tid i rumstemperatur innan man ska ta dem. Läs på förpackningen vilken tid som gäller just för dina sprutor.

Biverkningar - symtom och tips

Biverkningarna vi listar här är de vanligaste och viktigaste. De kan variera mycket mellan olika personer, och även från gång till gång. Biverkningarna kan avgöra din dos eller göra att det behövs ett uppehåll i behandlingen.

Berätta för din läkare eller sjuksköterska om du har biverkningar. Ofta kan besvären förebyggas eller lindras.

Smärta i muskler och skelett

Smärta, ömhet och svaghet i musklerna är vanligt.

Tips: Kan lindras med vanliga smärtlindrande läkemedel.

Anteckningar filgrastim

Du ska ta sprutor med filgrastim dag

Anteckningar
