

Zoledronsyra 4 mg

vid Övriga

Om din behandling

Zoledronsyra är skelettstärkande läkemedel som används för att behandla benskörhet. Du får läkemedlet i ett dropp. Drick några (1-2) glas vatten före behandlingen.

Behandlingen kan ske enligt olika tidsintervaller, beroende på individuella behov och behandlingsplaner. I sällsynta fall finns risk för skador på käkbenet. Zoledronsyra kan också orsaka försämrad läkning vid tandingrepp i framtiden. Då effekten av Zoledronsyra kvarstår efter utsättning är det därför viktigt att du alltid berättar för din tandläkare och tandhygienist att du behandlas eller har behandlats med Zoledronsyra. Munhygien är mycket viktigt för att förebygga tandproblem. Följ noga de råd du får av din tandläkare och tandhygienist.

Under behandlingen följs dina eventuella biverkningar.

Biverkningar - symtom och tips

Biverkningarna vi listar här är de vanligaste och viktigaste. De kan variera mycket mellan olika personer, och även från gång till gång. Biverkningarna kan avgöra din dos eller göra att det behövs ett uppehåll i behandlingen.

Berätta för din läkare eller sjuksköterska om du har biverkningar. Ofta kan besvären förebyggas eller lindras.

Influensaliknande symtom

Influensaliknande symtom med förhöjd kroppstemperatur, huvudvärk och värk i leder, muskler och skelett förekommer.

Tips: Du kan förebygga symtomen genom att ta Paracetamol 500-1000 mg 2-4 timmar före behandling

Smärta i muskler och skelett

Smärta, ömhet och svaghet i musklerna är vanligt.

Tips: Kan lindras med vanliga smärtlindrande läkemedel.

Anteckningar
