

Datum: \_\_\_\_\_

Läkare: \_\_\_\_\_

Kur nr: \_\_\_\_\_

Längd (cm): \_\_\_\_\_

Yta (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_

Vikt (kg): \_\_\_\_\_

Aktuellt GFR: \_\_\_\_\_

Patientdata (namn och personnr)

Beställande enhet, sjukhus, tel. & fax, kundnr

Antitumoral regim - Tjock- och ändtarmscancer

RegimID: NRB-10969

Bevacizumab-Lonsurf dag1-5, 8-12

(Bevacizumab+TAS-102, standard)

Diagnoskod: C18-C20

Kurintervall: 28 dagar

Ordination/Administrering

| Dag                                                                                        | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6 | 7 | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Bevacizumab<br>Intravenös infusion<br>5 mg/kg (kroppsvikt)                                 | x1 |    |    |    |    |   |   |    |    |    |    |    |    |    | x1 |    |    |    |    |    |    |
| Trifluridin, tipiracil<br>(TAS-102)<br>Peroral tablett<br>35 mg/m <sup>2</sup> (kroppsyta) | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 |   |   | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| Dag                                                                                        | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Ny kur dag 29 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---------------|
| Bevacizumab<br>Intravenös infusion<br>5 mg/kg (kroppsvikt)                                 |    |    |    |    |    |    |    |               |
| Trifluridin, tipiracil<br>(TAS-102)<br>Peroral tablett<br>35 mg/m <sup>2</sup> (kroppsyta) |    |    |    |    |    |    |    |               |

Lågemetogen.

Antiemetika enligt lokal instruktion. \_\_\_\_\_

Villkor och kontroller för administration

Kontakt med sjuksköterska varje vecka för biverkningskontroll.

Bevacizumab: Akutberedskap för infusionsreaktion. Första infusionerna ges enligt lokala rutiner, alternativt se Basfakta eller FASS.

Inför varje behandling - Blodtryck och urinsticka (proteinuri).

Urinsticka för protein (albumin):

0 till 1+: ge behandling

2 till 3+: se FASS eller lokala riktlinjer vid proteinuri.

Lonsurf (trifluridin, tipiracilhydroklorid): Om första Lonsurf dos dag 1 intas på kvällen (efter bevacizumab), tas resterande Lonsurf dosen istället på morgonen dag 6.

Tabletterna tas inom 1 timme efter frukost och kvällsmat. Om doser glöms bort ska patienten inte kompensera för uteblivna doser.

Trifluridin, tipiracil (TAS-102) Peroral tablett

Dosering i förhållande till måltid: Tas i samband med måltid

**Anvisningar för ordination**

Blodstatus inkl. neutrofila, kreatinin. Neutrofila  $\geq 1,5$  och TPK  $\geq 75$  för behandlingsstart.

Uppföljning av ev. biverkningar, t.ex. gastrointestinala och hud.

**Dosjustering rekommendation**

*Bevacizumab*: Ingen dosreduktion. Vid Bevacizumab-relaterade biverkningar (grad 3-4) avslutas behandlingen.

*Lonsurf* : Vid toxicitet kan dosen reduceras i tre steg - 30 mg/m<sup>2</sup>; - 25 mg/m<sup>2</sup>; -20 mg/m<sup>2</sup>. Se schema i fass:

<https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplld=20150401000018>

**Antiemetika**

Förslag enligt stöddokument:

<https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/lakemedelsregimer/antiemetika/forebyggande-mot-illamaende-steg-1/>

**DAG 1** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Trifluridin, tipiracil (TAS-102)** \_\_\_\_\_ **mg** Morgondos  
Ges peroralt

2. **Trifluridin, tipiracil (TAS-102)** \_\_\_\_\_ **mg** Kvällsdos  
Ges peroralt

3. Tablett/Injektion Antiemetika  
(Ej rutinmässigt vid minimal emetogen effekt.)

4. 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml  
Spoldropp att fördelas mellan och efter sista  
läkemedlet

5. Kontroll av blodtryck och urinsticka (proteinuri)

6. **Bevacizumab** \_\_\_\_\_ **mg** 30 min.  
i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml  
Ges intravenöst under 30 min.

**DAG 2** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Trifluridin, tipiracil (TAS-102)** \_\_\_\_\_ **mg** Morgondos  
Ges peroralt

2. **Trifluridin, tipiracil (TAS-102)** \_\_\_\_\_ **mg** Kvällsdos  
Ges peroralt

**DAG 3** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Trifluridin, tipiracil (TAS-102)** \_\_\_\_\_ **mg** Morgondos  
Ges peroralt

2. **Trifluridin, tipiracil (TAS-102)** \_\_\_\_\_ **mg** Kvällsdos  
Ges peroralt

**DAG 4** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Trifluridin, tipiracil (TAS-102)** \_\_\_\_\_ **mg** Morgondos  
Ges peroralt \_\_\_\_\_
2. **Trifluridin, tipiracil (TAS-102)** \_\_\_\_\_ **mg** Kvällsdos  
Ges peroralt \_\_\_\_\_

**DAG 5** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Trifluridin, tipiracil (TAS-102)** \_\_\_\_\_ **mg** Morgondos  
Ges peroralt \_\_\_\_\_
2. **Trifluridin, tipiracil (TAS-102)** \_\_\_\_\_ **mg** Kvällsdos  
Ges peroralt \_\_\_\_\_

**DAG 8** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Trifluridin, tipiracil (TAS-102)** \_\_\_\_\_ **mg** Morgondos  
Ges peroralt \_\_\_\_\_
2. **Trifluridin, tipiracil (TAS-102)** \_\_\_\_\_ **mg** Kvällsdos  
Ges peroralt \_\_\_\_\_

**DAG 9** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Trifluridin, tipiracil (TAS-102)** \_\_\_\_\_ **mg** Morgondos  
Ges peroralt \_\_\_\_\_
2. **Trifluridin, tipiracil (TAS-102)** \_\_\_\_\_ **mg** Kvällsdos  
Ges peroralt \_\_\_\_\_

**DAG 10** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Trifluridin, tipiracil (TAS-102)** \_\_\_\_\_ **mg** Morgondos  
Ges peroralt \_\_\_\_\_
2. **Trifluridin, tipiracil (TAS-102)** \_\_\_\_\_ **mg** Kvällsdos  
Ges peroralt \_\_\_\_\_

**DAG 11** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Trifluridin, tipiracil (TAS-102)** \_\_\_\_\_ **mg** Morgondos  
Ges peroralt \_\_\_\_\_
2. **Trifluridin, tipiracil (TAS-102)** \_\_\_\_\_ **mg** Kvällsdos  
Ges peroralt \_\_\_\_\_

**DAG 12** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Trifluridin, tipiracil (TAS-102)** \_\_\_\_\_ **mg** Morgondos  
Ges peroralt \_\_\_\_\_
2. **Trifluridin, tipiracil (TAS-102)** \_\_\_\_\_ **mg** Kvällsdos  
Ges peroralt \_\_\_\_\_

**DAG 15** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |                                                                                                          |         |  |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|-------|-------|
| 1. Tablett/Injektion Antiemetika<br>(Ej rutinmässigt vid minimal emetogen effekt.)<br>_____<br>_____     |         |  | _____ | ..... |
| 2. 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml<br>Spoldropp att fördelas mellan och efter sista<br>läkemedlet           |         |  | _____ | ..... |
| 3. Kontroll av blodtryck och urinsticka (proteinuri)                                                     |         |  |       | ..... |
| 4. <b>Bevacizumab</b> _____ <b>mg</b><br>i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml<br>Ges intravenöst under 30 min. | 30 min. |  | _____ | _____ |