

Datum: \_\_\_\_\_  
 Läkare: \_\_\_\_\_  
 Kur nr: \_\_\_\_\_  
 Längd (cm): \_\_\_\_\_ Vikt (kg): \_\_\_\_\_  
 Yta (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_ Aktuellt GFR: \_\_\_\_\_

Patientdata (namn och personnr)

Beställande enhet, sjukhus, tel. &amp; fax, kundnr

Antitumoral regim - Trofoblasterjukdomar

Behandlingsavsikt: Kurativ

**EMA-COb**

C55

Kurintervall: 14 dagar

Ordination/Administrering

Dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Ny kur dag 15
Etoposid Intravenös infusion 100 mg/m <sup>2</sup>	x1	x1													
Daktinomycin Intravenös infusion 0,5 mg	x1	x1													
Metotrexat Intravenös infusion 300 mg/m <sup>2</sup>	x1														
Kalciumfolinat (vattenfritt) Peroral tablett 15 mg		x2	x2												
Vinkristin Intravenös infusion 0,8 mg/m <sup>2</sup>								x1							
Cyklofosfamidmonohydrat Intravenös infusion 600 mg/m <sup>2</sup>								x1							
Metotrexat Intratekal injektion 12,5 mg									x1						
Kalciumfolinat (vattenfritt) Peroral tablett 15 mg										x1					

Medeleemetogen. Antiemetika enligt lokal instruktion. \_\_\_\_\_

**Villkor och kontroller för administration***Daktinomycin* - starkt vävnadsretande. Central infart rekommenderas.**Anvisningar för ordination**

Kontroll av blod- och elektrolytstatus samt hCG. För behandlingsstart neutrofila &gt; 1,5, LPK &gt; 2,5, TPK &gt; 100, Hb &gt; 100.

*Intratekalt Metotrexat ges kur 1-3. Kalciumfolinat dag 10 ges 24 tim efter it injektion.**EMA (Etoposid och Daktinomycin) dag 2 seponeras vid hCG-negativitet!**Metotrexat* - Kalciumfolinat dag 2 startas 24 tim efter start av Metotrexat infusion. Ges därefter var 12:e timme i fyra doser. Doserna kan ges i.v. i samma dos som peroralt.

Dagligt vätskeintag på cirka 1,5 liter rekommenderas behandlingsdagar samt 2 dagar efter.

Överväg primär G-CSF profylax.

**Dosreduktion rekommendation***Hematologisk toxicitet*

Neutrofila < 1,5 och TPK < 100 - överväg dosreduktion av Etoposid och Cyklofosamid till 75 %. Profylaktiskt G-CSF.

Övriga läkemedel ges i fulldos.

hCG skall halveras mellan varje kur. Vid platå eller stegring av hCG överväg terapibyten.

**DAG 1** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

500 ml Natriumklorid 9 mg/ml

*Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet*

Tablett/Injektion Antiemetika

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Etoposid \_\_\_\_\_ mg**

i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Ges intravenöst under 1 tim.

1 tim.

**Daktinomycin \_\_\_\_\_ mg**

i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Ges intravenöst under 30 min.

30 min.

**Metotrexat \_\_\_\_\_ mg**

i 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Ges intravenöst under 12 tim.

12 tim.

**DAG 2** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

500 ml Natriumklorid 9 mg/ml

*Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet*

Tablett/Injektion Antiemetika

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Etoposid \_\_\_\_\_ mg**

i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Ges intravenöst under 1 tim.

1 tim.

**Daktinomycin \_\_\_\_\_ mg**

i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Ges intravenöst under 30 min.

30 min.

**Kalciumfolinat (vattenfritt) \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

*(Ges 24 timmar efter start av Metotrexat-infusion.)*

**Kalciumfolinat (vattenfritt) \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

*(Ges 36 timmar efter start av Metotrexat-infusion.)*

**DAG 3** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**Kalciumfolinat (vattenfritt) \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

(Ges 48 timmar efter start av  
Metotrexat-infusion.)

\_\_\_\_\_

**Kalciumfolinat (vattenfritt) \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

(Ges 60 timmar efter start av  
Metotrexat-infusion.)

\_\_\_\_\_

**DAG 8** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

500 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spoldropp att fördelas mellan och efter sista  
läkemedlet

\_\_\_\_\_

.....

Tablett/Injektion Antiemetika

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

.....

**Vinkristin \_\_\_\_\_ mg**

i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml

30 min.

Ges intravenöst under 30 min.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Cyklofosamidmonohydrat \_\_\_\_\_ mg**

i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml

30 min.

Ges intravenöst under 30 min.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**DAG 9** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**Metotrexat \_\_\_\_\_ mg**

Ges intratekalt

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**DAG 10** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**Kalciumfolinat (vattenfritt) \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

(Ges 24 timmar efter Metotrexat it.)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_