

**Antitumoral regim - Urinblåse- och
urinvägscancer**

Epirubicin intravesikal endosinstillation

Behandlingsavsikt: Adjuvant

RegimID: NRB-1319

Översikt**Läkemedel**

Substans	Admin-istrering	Spädning	Infusion-stid	Grunddos/admtillfälle	Beräkn-ingssätt	Maxdos/admtillfälle	Max ack. dos
1. Epirubicin	Intravesikal instillation			50 mg	standarddos		

Regimbeskrivning

Dag	1
1. Epirubicin Intravesikal instillation	x1
50 mg	

Behandlingsöversikt

Instillationsbehandlingen görs direkt efter TURB (transuretral resektion), optimalt inom 6 timmar.

Anvisningar för regimen**Villkor för start av regimen**

OBSERVERA att perforation i samband med TURB är en kontraindikation för tidig postoperativ instillationsbehandling.

Anvisningar för ordination

Högre dos (80 mg) har använts i randomiserade studier.

Övrig information

Se basfakta.

Biverkningar

Epirubicin Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Cysttit Lokala oftast reversibla reaktioner som bränrande känsla vid miktion och frekvent urinering vanligt. Enstaka fall av cysttit (kemisk eller bakteriell). Nekros i urinblåseväggen.		
Starkt vävnadsretande Observera att substansen är starkt vävnadsretande.		

Referenser**Oddens et al. Effect of age BCG relative Epirubicin**www.regimbiblioteket.se/dokument/0ddens%20Eur%20Urol%202014.pdf