Antitumoral regim - Urinblåse- och urinvägscancer

RegimID: NRB-1319

Epirubicin intravesikal endosinstillation

Diagnoskod: C67

Översikt

Läkemedel

Substans	Administrering	Spädning	Infusionstid	Grunddos/ admtillfälle	Beräkningssätt	Maxdos/ admtillfälle	Max ack. dos
1. Epirubicin	Intravesikal instillation			50 mg	standarddos		

Regimbeskrivning

Dag	1
1. Epirubicin Intravesikal instillation 50 mg	x1

Emetogenicitet: Minimal

Behandlingsöversikt
Instillationsbehandlingen görs direkt efter TURB (transuretral resektion), optimalt inom 6 timmar.

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen
OBSERVERA att perforation i samband med TURB är en kontraindikation för tidig postoperativ instillationsbehandling.

Anvisningar för ordination
Högre dos (80 mg) har använts i randomiserade studier.

Antiemetika
Ingen rutinmässig behandling

Övrig information
Se basfakta.

Biverkningar

Epirubicin

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Cystit Lokala oftast reversibla reaktioner som brännande känsla vid miktion och frekvent urinering vanligt. Enstaka fall av cystit (kemisk eller bakteriell). Nekros i urinblåseväggen.		
Starkt vävnadsretande Observera att substansen är starkt vävnadsretande.		

Referenser

Oddens et al. Effect of age BCG relative Epirubicin
www.regimbiblioteket.se/dokument/Oddens%20Eur%20Urol%202014.pdf

Versionsförändringar

Version 1.1
antiemeika Ingen rutinmässig behandling