

# Antitumoral regim - Urinblåse- och urinvägscancer

RegimID: NRB-1319

## Epirubicin intravesikal endosinstillation

Diagnoskod: C67

## Översikt

### Läkemedel

Substans	Administrering	Spädning	Infusionstid	Grunddos/admtillfälle	Beräkningssätt	Maxdos/admtillfälle	Max ack. dos
1. Epirubicin	Intravesikal instillation			50 mg	standarddos		

### Regimbeskrivning

Dag	1
1. Epirubicin Intravesikal instillation 50 mg	x1

**Emetogenicitet:** Minimal**Behandlingsöversikt**

Instillationsbehandlingen görs direkt efter TURB (transuretral resektion), optimalt inom 6 timmar.

### Anvisningar för regimen

**Villkor för start av regimen**

OBSERVERA att perforation i samband med TURB är en kontraindikation för tidig postoperativ instillationsbehandling.

**Anvisningar för ordination**

Högre dos (80 mg) har använts i randomiserade studier.

**Antiemetika**

Ingen rutinmässig behandling

**Övrig information**

Se basfakta.

### Biverkningar

**Epirubicin****Observandum****Kontroll****Stödjande behandling****Cystit**

Lokala oftast reversibla reaktioner som brännande känsla vid miktion och frekvent urinering vanligt. Enstaka fall av cystit (kemisk eller bakteriell). Nekros i urinblåseväggen.

**Starkt vävnadsretande**

Observera att substansen är starkt vävnadsretande.

### Referenser

**Oddens et al. Effect of age BCG relative Epirubicin**[www.regimbiblioteket.se/dokument/Oddens%20Eur%20Uro1%202014.pdf](http://www.regimbiblioteket.se/dokument/Oddens%20Eur%20Uro1%202014.pdf)

### Versionsförändringar

**Version 1.1**

antiemeika Ingen rutinmässig behandling