

Datum: \_\_\_\_\_

Patientdata (namn och personnr)

Läkare: \_\_\_\_\_

Kur nr: \_\_\_\_\_

Beställande enhet, sjukhus, tel. &amp; fax, kundnr

Längd (cm): \_\_\_\_\_

Vikt (kg): \_\_\_\_\_

Yta (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_

Aktuellt GFR: \_\_\_\_\_

Antitumoral regim - Urinblåse- och  
urinvägscancer

RegimID: NRB-14368

**Erdafitinib**

Kurintervall: 28 dagar

**Ordination/Administrering**

Dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Erdafitinib Peroral tablett 9 mg (standarddos)	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1

Dag	22	23	24	25	26	27	28	Ny kur dag 29
Erdafitinib Peroral tablett 9 mg (standarddos)	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	

Lågemetogen.

Antiemetika enligt lokal instruktion. \_\_\_\_\_

**Villkor och kontroller för administration**

Grapefrukt och pomerans ska undvikas under behandling pga interaktionsrisk.

Uppföljning av biverkningar som bland annat berör ögon, hudbiverkningar, nagelförändringar, hand-fotsyndrom och mage-tarmbiverkningar.

Erdafitinib Peroral tablett

Dosering i förhållande till måltid: Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag

**Anvisningar för ordination**Övervakning av serumfosfat:

Risk för hyperfosfatemi. Serumfosfat bör kontrolleras efter 2-3 veckor initialt och därefter månadsvis under hela behandlingen.

Undvik D-vitamintillskott. Vid serumfosfatnivå >1,75 mmol/L (5,5 mg/dL) begränsa fosfatintaget till 600-800 mg/dag.

Startdos erdafitinib 8 mg per dag i 14-21 dagar, därefter bedömning serumfosfatnivå:

Om fosfat <2,24 mmol/L (<6,99 mg/dl) och frånvaro toxicitet dosöka till 9 mg.

Om fosfat 2,25-2,90 mmol/L (7,00-8,99 mg/dl) och frånvaro annan toxicitet dosöka till 9 mg och ge fosfatbindare tills fosfat <2,25 mmol/L.

Efter dag 21 används inte serumfosfat som vägledning i beslut om upptitrering, men kan styra dosminskning. Se <https://fass.se/health/product/20230909000021/smpec#dose>

Övervakning av ögonbiverkningar

Risk för ögonförändringar som kan bli allvarliga, se villkor för start och basfakta. Synen bör bedömas regelbundet med test av synskärpa och tecken på förändringar av näthinna/makula.

Amslers rutnätstest: varje månad första fyra månaderna, därefter var tredje månad enligt FASS. Vid avvikelser dvs om något i bilden ser förvrängt, missfärgat eller suddigt ut, och/eller vid nytilkommen synförsämring bör patienten omgående undersökas av ögonläkare.

Profylax mot torra ögon ska ges: t.ex. tårsubstitut, återfuktande eller smörjande ögongel eller salva minst varannan timme under dygnets vakna timmar. Patienten bör undvika kontaktlinser. Vid svår ögontorrhet under behandling bör patienten bedömas av ögonläkare.

Överväg recept på Loperamid och Canoderm.

**Dosjustering rekommendation**

Upphåll eller dosjustering kan bli nödvändig pga biverkningar.

Dosreduktion enligt tabell 1 i FASS. Lägsta dos 4 mg per dag. Se <https://fass.se/health/product/20230909000021/fass-text#dosage>.

För hyperfosatemi se tabell 2 i FASS.

För ögonförändringar se tabell 3 i FASS.

För nagel-, hud- och slemhinneförändringar se tabell 4.

För övriga biverkningar se tabell 5.

**Antiemetika**

Ingen rutinmässig antiemetika.

**DAG 1** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Erdafitinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

(Startdos 8 mg i kur 1. Kan ökas efter 14-21 dagar till 9 mg.)

**DAG 2** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Erdafitinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

(Startdos 8 mg i kur 1. Kan ökas efter 14-21 dagar till 9 mg.)

**DAG 3** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Erdafitinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

(Startdos 8 mg i kur 1. Kan ökas efter 14-21 dagar till 9 mg.)

**DAG 4** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Erdafitinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

(Startdos 8 mg i kur 1. Kan ökas efter 14-21 dagar till 9 mg.)

**DAG 5** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Erdafitinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

(Startdos 8 mg i kur 1. Kan ökas efter 14-21 dagar till 9 mg.)

**DAG 6** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Erdafitinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

(Startdos 8 mg i kur 1. Kan ökas efter 14-21 dagar till 9 mg.)

**DAG 7** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Erdafitinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

(Startdos 8 mg i kur 1. Kan ökas efter 14-21 dagar till 9 mg.)

**DAG 8** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Erdafitinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

(Startdos 8 mg i kur 1. Kan ökas efter 14-21 dagar till 9 mg.)

**DAG 9** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Erdafitinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

(Startdos 8 mg i kur 1. Kan ökas efter 14-21 dagar till 9 mg.)

**DAG 10** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Erdafitinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

(Startdos 8 mg i kur 1. Kan ökas efter 14-21 dagar till 9 mg.)

**DAG 11** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Erdafitinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

(Startdos 8 mg i kur 1. Kan ökas efter 14-21 dagar till 9 mg.)

**DAG 12** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Erdafitinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

(Startdos 8 mg i kur 1. Kan ökas efter 14-21 dagar till 9 mg.)

**DAG 13** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Erdafitinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

(Startdos 8 mg i kur 1. Kan ökas efter 14-21 dagar till 9 mg.)

**DAG 14** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Erdafitinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

(Startdos 8 mg i kur 1. Kan ökas efter 14-21 dagar till 9 mg.)

**DAG 15** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Erdafitinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

(Startdos 8 mg i kur 1. Kan ökas efter 14-21 dagar till 9 mg.)

**DAG 16** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Erdafitinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

(Startdos 8 mg i kur 1. Kan ökas efter 14-21 dagar till 9 mg.)

**DAG 17** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Erdafitinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

(Startdos 8 mg i kur 1. Kan ökas efter 14-21 dagar till 9 mg.)

**DAG 18** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Erdafitinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

(Startdos 8 mg i kur 1. Kan ökas efter 14-21 dagar till 9 mg.)

**DAG 19** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Erdafitinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

*(Startdos 8 mg i kur 1. Kan ökas efter 14-21 dagar till 9 mg.)*

**DAG 20** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Erdafitinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

*(Startdos 8 mg i kur 1. Kan ökas efter 14-21 dagar till 9 mg.)*

**DAG 21** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Erdafitinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

*(Startdos 8 mg i kur 1. Kan ökas efter 14-21 dagar till 9 mg.)*

**DAG 22** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Erdafitinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

**DAG 23** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Erdafitinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

**DAG 24** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Erdafitinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

**DAG 25** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Erdafitinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

**DAG 26** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Erdafitinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

**DAG 27** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Erdafitinib \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

**DAG 28** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Erdafitinib** \_\_\_\_\_ **mg**  
Ges peroralt