

Datum: _____
 Läkare: _____
 Kur nr: _____
 Längd (cm): _____ Vikt (kg): _____
 Yta (m²): _____ Aktuellt GFR: _____

Patientdata (namn och personnr)

Beställande enhet, sjukhus, tel. & fax, kundnr

Antitumoral regim - Urinblåse- och
 urinvägscancer

Behandlingsavsikt: Kurativ, Palliativ

Fluorouracil 5-dygnsinfusion-Mitomycin under strålbehandling (FuMi 5-dygnsinfusion)
 C65-C68

Kurintervall: 21 dagar

Ordnation/Administrering

Dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Ny kur dag 22
Mitomycin Intravenös infusion 12 mg/m ²	x1																					
Fluorouracil Bärbar infusionspump Intravenös infusion 2500 mg/m ²	x1	→	→	→	→																	

Medeleemetogen. Antiemetika enligt lokal instruktion. _____

Villkor och kontroller för administration

Central infart rekommenderas.

Anvisningar för ordinationKontroll av blodstatus inkl neutrofila. Neutrofila $\geq 1,5$ och TPK ≥ 75 för behandlingsstart.

Mitomycin - maxdos /administrationstillfälle 20 mg.

Dosreduktion rekommendationDosreducera Fluorouracil med 125 mg/m²/dag vid grad 2 mukosit eller diarré.Dosreducera Mitomycin och Fluorouracil till 75% vid neutrofila 1-1,5 eller TPK 75-100. Vid LPK $< 1,0$ och TPK < 75 avbryts cytostatika.

Avbryt cytostatikabehandling vid grad 3 mukosit eller diarré. Avbryt vid någon form av grad 4 biverkan.

DAG 1 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

250 ml Natriumklorid 9 mg/ml
 Spoldropp att fördelas mellan och efter sista
 läkemedlet

Tablett/Injektion Antiemetika

Mitomycin _____ mg
 i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml
 Ges intravenöst under 30 min.

Fluorouracil Bärbar infusionspump _____
 mg
 Ges intravenöst via Bärbar infusionspump
 (Efter 5 dygn kopplas pumpen bort.)

30 min.

5 dygn