

Datum: _____

Patientdata (namn och personnr)

Läkare: _____

Kur nr: _____

Beställande enhet, sjukhus, tel. & fax, kundnr

Längd (cm): _____

Vikt (kg): _____

Yta (m²): _____

Aktuellt GFR: _____

Antitumoral regim - Urinblåse- och

Behandlingsavsikt: Kurativ

urinvägscancer

Gemcitabin-Docetaxel intravesikal flerdosinstillation

C67

Kurintervall: 7 dagar

Ordination/Administrering

Dag	1	2	3	4	5	6	7	Ny kur dag 8
Gemcitabin Intravesikal instillation 1000 mg	x1							
Docetaxel (vattenfri) Intravesikal instillation 37,5 mg	x1							

Antiemetika enligt lokal instruktion. _____

Anvisningar för ordination

Efter blåstömning instilleras först Gemcitabin 1000 mg i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml i blåsan via tappningskateter och kvarhålls där i 60 min.

Blåsan töms, varefter Docetaxel 37,5 mg i 55 ml Natriumklorid 9 mg/ml instilleras via ny tappningskateter. Lösningen kvarhålls i 60-120 min.

Vid irriterande besvär av Gemcitabin, som är surt (pH 2,5), kan tablett Natriumbikarbonat 1 g ordineras kvällen innan och på morgonen inför behandlingen.

DAG 1 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign****Gemcitabin** _____ mg

Ges intravesikalt _____

Docetaxel (vattenfri) _____ mg

Ges intravesikalt _____