

Datum: _____
 Läkare: _____
 Kur nr: _____
 Längd (cm): _____ Vikt (kg): _____
 Yta (m²): _____ Aktuellt GFR: _____

Patientdata (namn och personnr)

Beställande enhet, sjukhus, tel. & fax, kundnr

Antitumoral regim - Urinblåse- och

urinvägscancer

Gemcitabin-Docetaxel intravesikal flerdosinstillation

Kurintervall: 7 dagar

Behandlingsavsikt: Kurativ

RegimID: NRB-7391

Ordnation/Administrering

Dag	1	2	3	4	5	6	7	Ny kur dag 8
Gemcitabin Intravesikal instillation 1000 mg	x1							
Docetaxel (vattenfri) Intravesikal instillation 37,5 mg	x1							

Antiemetika enligt lokal instruktion. _____

Anvisningar för ordination

Efter blåstömning instilleras först Gemcitabin 1000 mg i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml i blåsan via tappningskateter och kvarhålls där i 60 min.

Blåsan töms, varefter Docetaxel 37,5 mg i 55 ml Natriumklorid 9 mg/ml instilleras via ny tappningskateter. Lösningen kvarhålls i 60-120 min.

Vid irriterande besvär av Gemcitabin, som är surt (pH 2,5), kan tablett Natriumbikarbonat 1 g ordineras kvällen innan och på morgonen inför behandlingen.

DAG 1 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Gemcitabin** _____ **mg**
Ges intravesikalt

2. **Docetaxel (vattenfri)** _____ **mg**
Ges intravesikalt