

Datum: \_\_\_\_\_  
 Läkare: \_\_\_\_\_  
 Kur nr: \_\_\_\_\_  
 Längd (cm): \_\_\_\_\_ Vikt (kg): \_\_\_\_\_  
 Yta (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_ Aktuellt GFR: \_\_\_\_\_

Patientdata (namn och personnr)

Beställande enhet, sjukhus, tel. &amp; fax, kundnr

## Antitumoral regim - Urinblåse- och

urinvägscancer

**Gemcitabin-Docetaxel intravesikal flerdosinstillation**

Kurintervall: 7 dagar

Behandlingsavsikt: Kurativ

RegimID: NRB-8425

**Ordnation/Administrering**

Dag	1	2	3	4	5	6	7	Ny kur dag 8
Gemcitabin Intravesikal instillation 1000 mg	x1							
Docetaxel (vattenfri) Intravesikal instillation 37,5 mg	x1							

Antiemetika enligt lokal instruktion. \_\_\_\_\_

**Anvisningar för ordination**

Natriumbikarbonat tablett 2 X1 g ordineras kvällen innan och på morgonen inför behandlingen för att minska irriterande besvär av Gemcitabin (surt pH 2,5).

Patienten informeras om att vara restriktiv med vätska på morgonen före instillation.

Efter blåstömning instilleras först Gemcitabin 1000 mg i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml i blåsan via tappningskateter och kvarhålls där i 90 min.

Blåsan töms, varefter Docetaxel 37,5 mg i 55 ml Natriumklorid 9 mg/ml instilleras via ny tappningskateter. Lösningen kvarhålls i 90-120 min.

**DAG 1** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |   |       |       |
|---|-------|-------|
| 1. Premedicinering för Gemcitabin<br>(Två tabletter Natriumbikarbonat a´ 1 g intas<br>kvällen före samt på morgonen före instillation.) | _____ | _____ |
| 2. Gemcitabin _____ mg<br>Ges intravesikalt   | _____ | _____ |
| 3. Docetaxel (vattenfri) _____ mg<br>Ges intravesikalt  | _____ | _____ |