

Datum: _____
 Läkare: _____
 Kur nr: _____
 Längd (cm): _____
 Yta (m²): _____

Vikt (kg): _____
 Aktuellt GFR: _____

Patientdata (namn och personnr)

Beställande enhet, sjukhus, tel. & fax, kundnr

Antitumoral regim - Urinblåse- och
urinvägscancer

Gemcitabin-Docetaxel intravesikal flerdosinstillation

Kurintervall: 7 dagar

Behandlingsavskrift: Kurativ

RegimID: NRB-8425

Ordination/Administrering

Dag	1	2	3	4	5	6	7	Ny kur dag 8
Gemcitabin Intravesikal instillation 1000 mg	x1							
Docetaxel (vattenfri) Intravesikal instillation 37,5 mg	x1							

Antiemetika enligt lokal instruktion. _____

Anvisningar för ordination

Natriumbikarbonat tablett 2 X1 g ordinaras kvällen innan och på morgonen inför behandlingen för att minska irritativa besvär av Gemcitabin (surt pH 2,5).

Patienten informeras om att vara restriktiv med vätska på morgonen före instillation.

Efter blästömning instilleras först Gemcitabin 1000 mg i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml i blåsan via tappningskateter och kvarhålls där i 90 min.

Blåsan töms, varefter Docetaxel 37,5 mg i 55 ml Natriumklorid 9 mg/ml instilleras via ny tappningskateter. Lösningen kvarhålls i 90-120 min.

DAG 1 Datum_____ Beställs till kl_____ Avvakta ja nej Inf. tid Klockan Ssk. sign Läk. sign

1. Premedicinering för Gemcitabin
(Två tablett Natriumbikarbonat a' 1 g intas
kvällen samt på morgonen före instillation.)
2. **Gemcitabin** _____ mg
Ges intravesikalt
3. **Docetaxel (vattenfri)** _____ mg
Ges intravesikalt