

Datum: _____
 Läkare: _____
 Kur nr: _____
 Längd (cm): _____ Vikt (kg): _____
 Yta (m²): _____ Aktuellt GFR: _____

Patientdata (namn och personnr)

Beställande enhet, sjukhus, tel. & fax, kundnr

Antitumoral regim - Urinblåse- och
 urinvägscancer

RegimID: NRB-8425

Gemcitabin-Docetaxel intravesikal flerdosinstillation

Diagnoskod: C67

Kurintervall: 7 dagar

Ordination/Administrering

Dag	1	2	3	4	5	6	7	Ny kur dag 8
Gemcitabin Intravesikal instillation 1000 mg (standarddos)	x1							
Docetaxel (vattenfri) Intravesikal instillation 37,5 mg (standarddos)	x1							

Minimalemetogen.

Antiemetika enligt lokal instruktion. _____

Anvisningar för ordination

Natriumbikarbonat tablett 2 X1 g ordineras kvällen innan och på morgonen inför behandlingen för att minska irriterande besvär av Gemcitabin (surt pH 2,5).

Patienten informeras om att vara restriktiv med vätska på morgonen före instillation.

Efter blåstömning instilleras först Gemcitabin 1000 mg i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml i blåsan via tappningskateter och kvarhålls där i 90 min.

Blåsan töms, varefter Docetaxel 37,5 mg i 55 ml Natriumklorid 9 mg/ml instilleras via ny tappningskateter. Lösningen kvarhålls i 90-120 min.

Antiemetika

Ingen rutinmässig behandling

DAG 1 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1. Premedicinering för Gemcitabin
(Två tabletter Natriumbikarbonat a' 1 g intas
kvällen före samt på morgonen före instillation.) | _____ | _____ |
| 2. Gemcitabin _____ mg
Ges intravesikalt | _____ | _____ |
| 3. Docetaxel (vattenfri) _____ mg
Ges intravesikalt | _____ | _____ |