Gemcitabin intravesikal flerdosinstillation

vid Urologisk cancer

Schema för regimen

Ny kur dag 8

Dag	1	2	3	4	5	6	7
Gemcitabin	X						

Om din behandling

Gemcitabin är en form av cytostatika, som verkar lokalt i urinblåsan.

Behandlingen ges en gång i veckan under sex veckor. En kateter förs in via urinröret upp till urinblåsan. Via katetern sprutas gemcitabin långsamt in i urinblåsan. Under behandlingen följs dina eventuella biverkningar.

Biverkningar - symtom och tips

Biverkningar kan variera mycket mellan olika personer, och även från gång till gång.

Berätta för din behandlande sjuksköterska om du har biverkningar. Ofta kan besvären förebyggas eller lindras.

Besvär vid intravesikal behandling

Du kan uppleva besvär från urinblåsan så som sveda när du kissar, behov av att kissa ofta, blod i urinen, sveda i urinröret, smärta över urinblåsan och lokal hudirritation i underlivet.

Besvär med klåda och utslag

Du kan få klåda och utslag.

Tips: När du tvättar huden, var varsam och använd mild tvål. Smörj med mjukgörande kräm.

Allmänna råd

Mitomycin är starkt basisk. Första gången du kissar i hemmet efter behandlingen, häll 1 msk 24% ättika i toaletten, för att neutralisera läkemedlet av miljö- och avloppshänsyn. Sitt ner när du kissar, så att du undviker att stänka urin och cytostatika. När du är klar, stäng toalettlocket och spola 2 gånger. Skölj underlivet med vatten för att undvika hud irritationer. Detta gäller första gången du kissar efter behandlingen. Det är viktigt att inte bli gravid eller göra någon gravid när du behandlas med cancerläkemedel, eftersom läkemedlen kan påverka fostret. Använd därför säkra preventivmedel sex månader efter avslutad behandling. Om du är man, använd kondom vid sex med partner/partners inom 24 timmar efter behandlingen, eftersom cytostatika även utsöndras via sädesvätskan.

Allmän information och råd om cancer

Bra information om cancer finns hos både 1177 och Cancerfonden. För allmänna råd och stöd kontakta Cancerrådgivningen