

**Gemcitabin intravesikal flerdosinstillation**

for Urological cancer

الجدول الزمني للعلاج (يُقرأ الجدول من اليسار إلى اليمين)

8 قديجة عرج موي

يوم	1	2	3	4	5	6	7
Gemcitabin	X						

**فيما يتعلق بعلاجك**

جيمسيتابين Gemcitabin هو دواء مثبط لتكاثر الخلايا السرطانية حيث أن تأثيره يكون على منطقة المثانة. يتم تناول العلاج مرة واحدة في الأسبوع لمدة 6 أسابيع. يتم تمرير أنبوب رفيع - يسمى القسطرة - عبر مجرى البول حتى المثانة. يتم حقن جيمسيتابين ببطء في المثانة عبر القسطرة. ستتم مراقبة فحوصات الدم ورصد أي آثار جانبية أثناء فترة العلاج.

**آثار جانبية - الأعراض ونصائح**

الآثار الجانبية يمكن أن تختلف اختلافا كبيرا من شخص لآخر، وحتى من وقت لآخر. استشر طبيبك أو ممرضتك إذا عانيت من أي آثار جانبية، ففي كثير من الأحيان يمكن تجنب هذه الأعراض أو التخفيف من حدتها.

**مشكلات في الجلد**

قد تظهر أعراض على شكل الحكة والطفح الجلدي.

نصيحة: اغسل جسمك بعناية واستخدم صابونا خفيفا ثم ادهن جسمك بمستحضر ترطيب.

**نصائح عامة**

في المرة الأولى التي تتبول فيها بعد العلاج، صب ملعقة كبيرة من الخل 24% أو أي حمض آخر في المرحاض، لتعديل الدواء. اجلس عند التبول، حتى تتجنب تناثر البول و دواء تتهيئ الخلايا الموجودة في البول. عند الانتهاء، أغلق غطاء المرحاض وقم بالتصريف مرتين. شطف المنطقة الحساسة بالماء لتجنب تهيج الجلد. وهذا ينطبق على أول مرة تتبول فيها بعد العلاج.

من المهم عدم الحمل أو جعل أي شخص حاملاً أثناء علاجك بأدوية السرطان، لأن الأدوية يمكن أن تؤثر على الجنين. لذلك، استخدم وسائل منع الحمل الآمنة بعد ستة أشهر من انتهاء العلاج. إذا كنت رجلاً، فاستخدم الواقي الذكري عند ممارسة الجنس مع شريكك\ شركائك خلال 24 ساعة من بعد العلاج، حيث أنه يتم إفراز دواء مثبطات الخلايا أيضاً من خلال السائل المنوي.

**معلومات عامة عن مرض السرطان**

لمزيد من المعلومات حول مرض السرطان يرجى زيارة الموقع: Vårdguiden and Cancerfonden 1177

[www.1177.se](http://www.1177.se)

[www.cancerfonden.se](http://www.cancerfonden.se)

**ملاحظات**

