

Gemcitabin intravesikal flerdosinstillation

for Urological cancer

الجدول الزمني للعلاج (يُقرأ الجدول من اليسار إلى اليمين)

8 قد يدخل عرض يوم

يوم	1	2	3	4	5	6	7
Gemcitabin	X						

فيما يتعلق بعلاجك

جيومسيتابين هو دواء مثبط لتكاثر الخلايا السرطانية حيث أن تأثيره يكون على منطقة المثانة. يتم تناول العلاج مرة واحدة في الأسبوع لمدة 6 أسابيع. يتم تمرير أنبوب رفيع - يسمى القسطرة - عبر مجرى البول حتى المثانة. يتم حقن جيومسيتابين ببطء في المثانة عبر القسطرة. ستتم مراقبة فحوصات الدم ورصد أي آثار جانبية أثناء فترة العلاج.

آثار جانبية - الأعراض ونصائح

الآثار الجانبية يمكن أن تختلف اختلافاً كبيراً من شخص لاخر، وحتى من وقت لاخر. استشر طبيبك أو ممرضتك إذا عانيت من أي آثار جانبية، ففي كثير من الأحيان يمكن تجنب هذه الأعراض أو التخفيف من حدتها.

مشكلات في الجلد

قد تظهر أعراض على شكل الحكة والطفح الجلدي.

نصيحة: اغسل جسمك بعناية واستخدم صابونا خفيفا ثم ادهن جسمك بمستحضر ترطيب.

نصائح عامة

في المرة الأولى التي تتبول فيها بعد العلاج، صب ملعقة كبيرة من الخل 24٪ أو أي حمض آخر في المرحاض، لتعديل الدواء. اجلس عند التبول، حتى تتجنب تناثر البول و دواء تثبيط الخلايا الموجود في البول. عند الانتهاء،أغلق غطاء المرحاض وقم بالتصريف مرتين. شطف المنطقة الحساسة بالماء لتجنب تهيج الجلد. وهذا ينطبق على أول مرة تتبول فيها بعد العلاج.

من المهم عدم الحمل أو جعل أي شخص حاملاً أثناء علاجك بأدوية السرطان، لأن الأدوية يمكن أن تؤثر على الجنين. لذلك، استخدمي وسائل منع الحمل الآمنة بعد ستة أشهر من انتهاء العلاج. إذا كنت رجلاً، فاستخدم الواقي الذكري عند ممارسة الجنس مع شريكك \ شركائكم خلال 24 ساعة من بعد العلاج، حيث أنه يتم إفراز دواء مثبيطات الخلايا أيضاً من خلال السائل المنوي.

معلومات عامة عن مرض السرطان

لمزيد من المعلومات حول مرض السرطان يرجى زيارة الموقع: Vårdguiden and Cancerfonden 1177

www.1177.se

www.cancerfonden.se

ملاحظات

