Antitumoral regim - Urinblåse- och urinvägscancer

RegimID: NRB-1320

Mitomycin intravesikal endosinstillation

Diagnoskod: C67

Översikt

Läkemedel

Substans	Administrering	Spädning	Infusionstid	Grunddos/ admtillfälle	Beräkningssätt	Maxdos/ admtillfälle	Max ack. dos
1. Mitomycin	Intravesikal instillation			40 mg	standarddos		

Regimbeskrivning

Dag	1
1. Mitomycin Intravesikal instillation 40 mg	x1

Emetogenicitet: Minimal

Behandlingsöversikt
Instillationsbehandling utförs direkt efter TURB (transuretral resektion), optimalt inom 6 timmar.

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen
OBSERVERA att perforation i samband med TURB utgör en kontraindikation för postoperativ intravesikal endosinstillation.

Antiemetika
Ingen rutinmässig behandling

Övrig information
Se basfakta.

Biverkningar

Mitomycin

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Cystit	Biverkningskontroll	
Lokala oftast reversibla reaktioner som brännande känsla vid miktion och frekvent urinering vanligt. Enstaka fall av cystit (kemisk eller bakteriell). Nekros i urinblåseväggen.		
Hudtoxicitet	Biverkningskontroll	Antihistamin
Allergiska hudutslag, klåda, kontaktdermatit förekommer. Motverka genom sköljning av underliv alternativ tvätt med olja efter första miktion. Eventuellt behov symtomatisk behandling antihistamin, kortison.		
Graviditetsvarning		
Preventivmedel måste användas under och 6 mån efter avslutad behandling. Primärt syfte förhindra graviditet, då mitomycin kan medföra fosterskador. Risk för irreversibel infertilitet hos män. Överväg kontakt med fertilitetslaboratoriet.		
Övrigt		
Mitomycin är starkt basiskt. Ur miljöhänsyn bör därför neutralisering med syra ske efter första miktion i toalett i hemmet. Angiven mängd 5 ml ättika 24%, dvs om 1 msk 24% ättika används är det med råge uppfyllt. I sjukvården hantering enligt farligt avfall/spill, se vårdhandboken.		

Versionsförändringar

Version 1.1
antieemtika Ingen rutinmässig behandling