

Datum: _____

Patientdata (namn och personnr)

Läkare: _____

Kur nr: _____

Beställande enhet, sjukhus, tel. & fax, kundnr

Längd (cm): _____

Vikt (kg): _____

Yta (m²): _____

Aktuellt GFR: _____

Antitumoral regim - Urinblåse- och

Behandlingsavsikt: Palliativ

urinvägscancer

Vinflunin 280

C65-C68

Kurintervall: 21 dagar

Ordination/Administrering

Dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Ny kur dag 22	
Vinflunin Intravenös infusion 280 mg/m ²	x1																						

Medeleemetogen. Antiemetika enligt lokal instruktion. _____

Anvisningar för ordination

Inför ny kur kontroll av blodstatus inkl. neutrofila, elektrolyter, leverstatus.

DAG 1 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej Inf. tid Klockan Ssk. sign Läk. sign

500 ml Natriumklorid 9 mg/ml
Spoldropp att fördelas mellan och efter sista
läkemedlet
(Cirka hälften av spoldroppet ges före infusionen
med vinflunin och hälften ges efter.)

Tablett/Injektion Antiemetika

Vinflunin _____ mg

i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml

20 min.

Ges intravenöst under 20 min.