Datum: _____

Läkare: _____

Kur nr: _____

Längd (cm): _____ **Vikt (kg):** _____

Yta (m^2): _____ **Aktuellt GFR:** _____

Patientdata (namn och personnr)

Beställande enhet, sjukhus, tel. & fax, kundnr

Antitumoral regim - Urinblåse- och urinvägscancer

RegimID: NRB-1318

BCG intravesikal flerdosinstillation

Diagnoskod: C67

Kurintervall: 7 dagar

Ordination/Administrering

Dag	1	2	3	4	5	6	7	Ny kur dag 8
Mycobacterium bovis, Bacillus Calmette-Guérin (BCG), RIVM-deriverad stam (1173-P2), levande försvagad Intravesikal instillation 12,5 mg (standarddos)	x1							

Antiemetika enligt lokal instruktion. _____

Villkor och kontroller för administration

Stor försiktighet vid katetriseringen för att undvika traumatisering. Skadad slemhinna kan ge upphov till systemisk BCG-infektion.

Anvisningar för ordination

Alternativt kan OncoTice användas.

DAG 1 Datum_____ Beställs till kl____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Mycobacterium bovis, Bacillus Calmette-Guérin (BCG), RIVM-deriverad stam (1173-P2), levande försvagad _____ mg** _____ _____
   Ges intravesikalt
   (Se basfakta)