Antitumoral regim - Urinblåse- och urinvägscancer

RegimID: NRB-1318

BCG intravesikal flerdosinstillation

Diagnoskod: C67
Kurintervall: 7 dagar

Översikt

Läkemedel

Substans	Administrering	Spädning	Infusionstid	Grunddos/ admtillfälle	Beräkningssätt	Maxdos/ admtillfälle	Max ack. dos
1. Mycobacterium bovis, Bacillus Calmette-Guérin (BCG), RIVM-deriverad stam (1173-P2), levande försvagad	Intravesikal instillation			12,5 mg	standarddos		

Regimbeskrivning

Dag	1	2	3	4	5	6	7	Ny kur dag 8
1. Mycobacterium bovis, Bacillus Calmette-Guérin (BCG), RIVM-deriverad stam (1173-P2), levande försvagad Intravesikal instillation 12,5 mg	x1							

Behandlingsöversikt
En instillation per vecka i 6 veckor med behandlingsstart cirka 4 veckor efter TURB (transuretral resektion), se Vårdprogram, bilaga 5.

Som underhållsbehandling föreslås 1 instillation per vecka i 3 veckor vid 3, 6 och 12 månader.

Anvisningar för regimen

Villkor och kontroller för administration
Stor försiktighet vid katetriseringen för att undvika traumatisering. Skadad slemhinna kan ge upphov till systemisk BCG-infektion.

Anvisningar för ordination
Alternativt kan OncoTice användas.

Övrig information
Se basfakta.

Biverkningar

Mycobacterium bovis, Bacillus Calmette-Guérin (BCG), RIVM-deriverad stam (1173-P2), levande förs

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Cystit Obehag och smärta vid miktion vanlig och övergående. Inflammatorisk reaktion kan utgöra väsentlig del av antitumöraktiviteten.		
Immunologisk reaktion Övergående systemisk BCG-reaktion: låg feber, influensaliknande symtom och allmänt obehag. Avklingar vanligen inom 24-48 timmar.		Paracetamol

Mycobacterium bovis, Bacillus Calmette-Guérin (BCG), RIVM-deriverad stam (1173-P2), levande förs

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Infektionsrisk Allvarlig systemisk BCG-reaktion: feber >39 grader i minst 12 timmar, feber >38,5 grader i minst 49 timmar, se FASS. Kan leda till BCG-sepsis, vilket är en livshotande situation.		

Referenser

Oddens et al. Effect of age BCG relative epirubicin
www.regimbiblioteket.se/dokument/Oddens%20Eur%20Urol%202014.pdf

Rentsch et al. BCG strain have an impact on outcome
www.regimbiblioteket.se/dokument/Rentsch%20Eur%20Urol%202014.pdf

Vårdprogram, bilaga 5
www.regimbiblioteket.se/dokument/vp%20urinvagar%20aug15.pdf#page=99

Versionsförändringar

Version 1.1
lagt till patientinformationen