

## Antitumoral regim - Livmoderkroppscancer

RegimID: NRB-8144

**Dostarlimab var 6:e vecka**

Diagnoskod: C54

Kurintervall: 42 dagar

## Översikt

**Läkemedel**

Substans	Admini- strering	Spädning	Infusions- tid	Grunddos/ admtillfälle	Beräk- ningssätt	Maxdos/ admtillfälle	Max ack. dos
1. Dostarlimab	Intravenös infusion	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml infusion	30 min.	1000 mg	standarddos		

**Regimbeskrivning**

Dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1. Dostarlimab Intravenös infusion 1000 mg	x1																					

Dag	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	Ny kur dag 43	
1. Dostarlimab Intravenös infusion 1000 mg																							

**Emetogenicitet:** Minimal**Behandlingsöversikt**

Ges efter 4 introduktionskuror med Dostarlimab var 3:e vecka. Startas 21 dagar efter förra behandlingen.

**Anvisningar för regimen****Villkor för start av regimen**

Recidiverande eller avancerad endometrieccancer med dMMR eller MSI-H som progredierat efter platinainnehållande behandling.

Blodstatus: Hb, LPK, neutrofila, TPK

Elektrolytstatus: Na, K, Ca, kreatinin

Leverstatus: albumin, ALP, ASAT, bilirubin, LD

Pankreasamylas, CRP, glukos

Thyroidea: TSH, T4 fritt

**Villkor och kontroller för administration**

Ökad beredskap för anafylaktisk reaktion. Vid reaktion gör uppehåll med infusionen. Om reaktion avtar inom 1 timme återuppta infusion med halverad hastighet. Vid grad 3-4 reaktion, avbryt behandling permanent.

Använd ett infusionsset med inbyggt eller monterat filter av polyetersulfon (PES), porstorlek 0,2 -0,22 mikrometer.

Sjuksköterskekontakt efter behandling enligt individuell bedömning för kontroll av immunrelaterade biverkningar, som främst berör GI, lever, hud, neurologi och endokrina system. Se stöddokument-omvårdnad

(https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/globalassets/regimbiblioteket/dokument/omvardnad-bedomningsstod-for-biverkningar-av-immunterapi.pdf )

**Anvisningar för ordination**

Provtagning var 3:e vecka:

Elektrolytstatus: Na, K, kreatinin

Leverstatus: albumin, ALP, ASAT, bilirubin, LD

Pankreasamylas, CRP, glukos

Blodstatus: Hb, LPK, neutrofila, TPK

Kalcium

Thyroidea: TSH, T4 fritt

Kontroller som inför start ska också följas en gång/månad i 6 månader efter avslutad behandling.

Kontroll av immunrelaterade biverkningar, som kan uppkomma sent. Immunhämmande behandling med i första hand kortikosteroider kan behövas, se stöddokument

<https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/globalassets/regimbiblioteket/dokument/bedomning-och-hantering-av-biverkningar-med-checkpointhammare.pdf> )

Vid eventuell infusionsreaktion kan premedicinering med Paracetamol och Desloratadin ges.

**Dosjustering rekommendation**

Dosreduceras ej. Uppehåll eller behandlingsavslut görs vid svårare toxicitet, och då ska också behandling med steroider övervägas, se FASS (<https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplld=20200310000019#dosage>)

**Antiemetika**

Ingen rutinmässig behandling

**Övrig information**

Patienten ska få tydlig information om eventuella biverkningar.

<https://www.fass.se/LIF/produktmaterialmedia?produktMaterialId=3171&produktMaterialTyp=RMM>

**Biverkningar**

Dostarlimab Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
<b>Övrigt</b> Observera att immunologiska biverkningar generellt kan uppstå sent, även efter behandlingsavslut. Eventuellt behov av kortikosteroidbehandling, se FASS.		
<b>Akut infusionsreaktion/anafylaxi</b> Infusionsrelaterade reaktioner förekommer. Eventuellt avbruten infusion, avvakta en timme och eventuell återupptag av infusion i lägre hastighet, se FASS.	Monitorering Blodtryck Puls	Akutberedskap
<b>Hematologisk toxicitet</b> Anemi vanligt, kan nå grad 3-4.	Blodvärden	
<b>Gastrointestinal påverkan</b> Diarré, illamående och kräkningar vanliga. Kolit och pankreatit har rapporterats, kan uppstå sent efter behandlingsstart, eventuellt behandlingsuppehåll eller utsättning och kortisonbehandlingsbehov, se FASS.		
<b>Levertoxicitet</b> Förhöjda levervärden vanliga. Följ levervärden före och under behandlingen. Hepatit finns rapporterat, kan uppstå sent efter behandlingsstart, eventuellt behandlingsuppehåll eller utsättning och kortisonbehandlingsbehov, se FASS.	Blodvärden	
<b>Andningsvägar</b> Interstitiell lungsjukdom /pneumonit förekommer. kan uppstå sent efter behandlingsstart, utred vid misstanke, eventuellt behandlingsuppehåll eller utsättning och kortisonbehandlingsbehov, se FASS.	Biverkningskontroll	
<b>Endokrinologi</b> Hypothyreos och hyperthyreos förekommer. Binjurebarksinsufficiens förekommer Thyroidit och hypofysit har rapporterats. Diabetes har rapporterats. De immunologiska biverkningarna kan uppstå sent efter behandlingsstart, utred vid misstanke, eventuellt behandlingsuppehåll eller utsättning och kortisonbehandlingsbehov, se FASS.	Blodvärden	

Fortsättning på nästa sida

**Dostarlimab (Fortsättning)****Observandum****Kontroll****Stödjande behandling****Njurtoxicitet**

Nefrit har rapporterats. Det kan uppstå sent efter behandlingsstart, utred vid misstanke, eventuellt behandlingssupphåll eller utsättning och kortisonbehandlingsbehov, se FASS.

**Hudtoxicitet****Biverkningskontroll**

Klåda och utslag vanligt. Immunrelaterade hudutslag förekommer, de kan uppstå sent efter behandlingsstart, utred vid misstanke, eventuellt behandlingssupphåll eller utsättning och kortisonbehandlingsbehov, se FASS.

**Ögonpåverkan**

Uveit har rapporterats, kan uppstå sent efter behandlingsstart, utred vid misstanke, eventuellt behandlingssupphåll eller utsättning och kortisonbehandlingsbehov, se FASS.

**Övrigt**

Immunrelaterad artralgi (ledvärk) förekommer, kan uppstå sent efter behandlingsstart, utred vid misstanke, eventuellt behandlingssupphåll eller utsättning och kortisonbehandlingsbehov, se FASS.

**Extravasering****Grön**

Ej vävnadsskadande (låg eller minimal risk för vävnadsskada vid extravasering).

**Referenser****Stöddokument: Bedömning och hantering av biverkningar med checkpointhämmare**

Stöddokument: Bedömning och hantering av biverkningar med checkpointhämmare

<https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/globalassets/regimbiblioteket/dokument/bedomning-och-hantering-av-biverkningar-med-checkpointhammare-ver-.220414.pdf>

**Versionsförändringar****Version 1.4**

antiemtika Ingen rutinmässig behandling

**Version 1.3**

Bytt namn på regimen till Dostarlimab var 6:e vecka från Dostarlimab monoterapi kur 5 osv, i enlighet med namnsättning av övriga regimer med checkpointhämmare och kombinationer.

**Version 1.2**

lagt till patientinformationen

**Version 1.1**

Justerat länkadress till stöddokument

**Version 1.0**

Regimen fastställdes